


Ghana

5 – 19 januari 2013



Daniel Bengtsson




Base 802504 (A00953) 6-96

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Shai Hills Resource Reserve | 7. Brenu Beach |
| 2. Sakumo Lagoon | 8. Aboabo Forest |
| 3. Winneba Plain | 9. Bonkro Forest |
| 4. Kakum National Park | 10. Mole National Park |
| 5. Nsutu Forest | 11. Bobiri Forest |
| 6. Ankasa Conservation Area | 12. Atewa Range |

DELTAGARE

Inger Christiansson, Malmö
 Börje Dahlén, Malung
 Thomas Grønn, Oslo
 Eva Knutsson, Trollhättan
 Lars Nilsson, Horn
 Magnus Vesterlind, Wien



RESELEDARE

Daniel Bengtsson, Kalmar (reseledare)

RESRUTT

- 5/1 Flyg Skandinavien – Accra (via Amsterdam)
- 6/1 Shai Hills Resource Reserve – Sakumo Lagoon – Winneba Plain – Rainforest Lodge
- 7/1 Kakum National Park – Rainforest Lodge
- 8/1 Antwkwaa – Abrafo Forest – Rainforest Lodge
- 9/1 Abrafo Forest – Nsutu Forest – Shama
- 10/1 Shama – Nsutu Forest – Ankasa Conservation Area – Half Assini
- 11/1 Half Assini – Ankasa – Brenu Beach – Rainforest Lodge
- 12/1 Rainforest Lodge – Aboabo Forest – Bonkro Forest – Kumasi
- 13/1 Kumasi – Takoradi – Mole National Park
- 14/1 Mole National Park
- 15/1 Mole National Park
- 16/1 Mole National Park – Takoradi – Kumasi
- 17/1 Kumasi – Bobiri Forest – Atewa Range – Koforidua
- 18/1 Koforidua – Atewa Range – Accra (hemresa)
- 19/1 Ankomst Skandinavien (via Amsterdam)

OMSLAG. *Black Bee-eater*. Foto: Daniel Bengtsson

DENNA SIDA. *Yellow-headed Picathartes*. Teckning: Peter Elfman



Glad kakaoplockerska.

Foto: Daniel Bengtsson

INLEDNING

Ghana är i många avseenden ett västafrikanskt föregångsland, men har först på 2000-talet seglat upp som en komet på skådarhimlen. Den enskilt främsta orsaken därtill är återupptäckten av *Yellow-headed Picathartes* 2003 (arten var då inte dokumenterad i Ghana sedan 1960-talet). Relativt bra vägar och boendemöjligheter samt i allmänhet god och vällagad mat underlättar välmåendet för besökare. Landet är ungefär hälften så stort som Sverige och de flesta skådarlokalerna ligger ganska koncentrerat. Nationalparken Mole, 70 mil nordväst Accra, är den mest avlägsna utposten på en normal tvåveckors skådarrutt.

Mest intressant är skådningen i regnskogsbältet Upper Guinea, som skiljs från Lower Guinea (och vidare Kongobäckenet) av en savannremsa som når kusten i sydöstra Ghana, Togo och Benin (Accra får 720 mm regn/år, mindre än hälften av det nederbörd som skulle krävas för att upprätthålla regnskog). Flertalet skogslokaler är av sekundär karaktär och relativt öppna, vilket möjliggör en hel del tubspaning och någorlunda lättobserverade fåglar. För att se de skulkande arterna krävs dock, som alltid, tålamod. Guineasavannen i Mole är relativt sluten. Den bästa överblicken erbjuds från lodgen på en höjd med utsikt ner mot ett par vattenhål och delar av nationalparken.

Ghana ger ett gott utbud av exotiska fågelfamiljer. En sådan är hornkorparna och kanske är Ghana det land där man ser allra flest. Vi noterade 11 arter (varav 2 bara hörda). De två små *Black* och *Red-billed Dwarf Hornbill* kan vara svåra men visade sig mycket väl, liksom den västafrikanska endemen *Brown-cheeked Hornbill*. Vackra solfåglar finns det många och vi fick se hela 21 arter (maximalt 12 på en dag). Spektakulära biätare representerades bl a av specialarna *Rosy* (övervintrare) och *Blue-headed* (sparsam häckfågel) samt skönheterna *Black*, *Red-throated* och *Northern Carmine Bee-eater*. Totalt observerades 424 arter på resan.

Juvelen i den ghananska fågelkronan är otvetydigt *Yellow-headed Picathartes* (vithakad kråktrast), en av två arter i en närmast mytomspunnen familj. Båda häckar på undanskymda klippväggar i Upper respektive Lower Guinea Forests. Regnskogens fragmentering har dess-

värre gjort att flera av delpopulationerna blivit så små och isolerade att de på sikt knappast kan överleva. De övernattar i sina murade lerbon året runt. Dagtid är de i princip osynliga, då de mycket diskret och vaksamt födosöker på regnskogsgolvet. Efter 1½ timmes väntan skymtade vi strax innan skymningen vita vålnader ljudlöst komma skuttande upp mot klippan. Med stora mörka ögon, gult skalligt huvud, lång stjärt och långa kraftiga ben skapade de associationer till någon märklig blandning av skata, gam, hönsfågel, myrpitta och ”spöket Laban” – sannerligen en av världens märkligaste fåglar!



Canopy walkway, Kakum National Park.

Foto: Daniel Bengtsson



Robert och vår lokale ledsagare.

Foto: Daniel Bengtsson

RESEDAGBOK

Lördag 5 januari

Avfärd från Oslo, Stockholm, Linköping, Göteborg och Köpenhamn, uppsamling i Amsterdam för vidare flyg 6½ timme ungefär enligt tidtabell. Ankomst till 25 grader i Accra kl 19.45 (GMT). Seg passkontroll, varefter vi möter vår väntande stab bestående av Robert (huvudguide), Emmanuel (guide/assistent) och Appiah (chaufför). Transport till Alexis Hotel öster om huvudstaden, där vi checkar in kl 22.15.

Söndag 6 januari

Frukost kl 05, avfärd en halvtimme senare, så att vi i gryningen är på plats i Shai Hills, ett 52 km² stort reservat i Dahomey Gap (savannområdet som separerar regnskogsbältena), där vi hör bulbylkören vakna. En rovfågel uppmot klippkanten påminner starkt om *Bat Hawk*, men observationen är för snabb för bestämning. Möjligen var det trots allt bara en *slagfalk* på fladdermusjakt. Morgontemperaturen är behaglig när vi beskådar *White-shouldered Tit*, *Senegal Eremomela*, *Croaking Cisticola*, *Northern Black Flycatcher*, *Viellot's Barbet*, *Shikra*, *African Grey Hornbill* och *Black-crowned Tchagra*. Snart möter vi också *White-crowned Cliff-Chat*, *Common Wattle-eye*, *Yellow-fronted Tinkerbird* och *Splendid Sunbird*. Från slutningen spelar *Stone Partridge* livligt. Lite läng-

re fram går ett par på vägen och en flock *marockanska frankoliner* stöts från ett träd. *Senegal Parrots* passerar förbi och *Levaillant's Cuckoo* poserar. Ute på den mer öppna, vid denna tidpunkt tämligen gröna och välvuxna savannen, ses *White-throated Bee-eater*, *Blue-bellied Roller*, *Yellow-throated Longclaw* och *White Helmet-Shrike*. Vid vändpunkten skådar vi upp mot en bergknalle (kopje) där *Violet Turaco* blixtrar till. Ovanför flyger *African Cuckoo-Hawk*, *Red-necked Buzzard* och *Rock Martin*. Av däggdjur noteras *Olive Baboon*, *Callithrix Monkey* och *Lesser Spot-nosed Monkey*. Temperaturen har nu stigit till >30 grader (kl 10.30).

Efter lunch tillbaka på Alexis Hotel avgår vi kl 12 mot Sakumo Lagoon utanför Tema. Där vidtar en stunds intensiv skådning med bl a 8 arter *hägrar* och diverse vadare: *stylltöpare*, *rödvingad vadar-svala*, *sporrvipa*, *kustpipare*, *svartsnäppa*, *sandlöpare*, *spovsnäppa*, *småsnäppa* m fl. Fyra *stjärtänder* får anses ha nått sydgränsen av sitt övervintningsområde. När vi lämnar lokalen visar sig en grupp *Yellow-billed Shrikes*.

Under eftermiddagen far vi västerut mot Kakum National Park. Längs vägen stannar vi på Winneba Plain, där vi på brända ytor finner *Senegal Lapwing* (30 ex) och *Plain-backed Pipit*. Runt den fortfarande aktiva gräsbranden jagar en flock *Preuss's Swallows* (150 ex) samt någon enstaka *Ethiopian Swallow*. Dessutom ses *slagfalk*, *svartvingad glada*,

Red-necked Buzzard, *Yellow-crowned Gonolek* och *Red-winged Warbler*. Efter ytterligare två timmars transport når vi Rainforest Lodge strax före halv åtta. Dusch och fottvagning behövs efter promenaden på bränd mark. Sedan buffé och summering av 112 arter första dagen.

Måndag 7 januari

Frukost och avfärd kl 05 som igår (och ungefärlig standard under hela resan). 20 minuters bussfärd tar oss till parkeringen vid Kakum National Park (375 km² regnskog). Denna är Ghanas mest populära, med besökstal som under toppåren närmar sig 100 000 st (varav majotiteten är ghananer). En av orsakerna därtill är den 330 m långa ”canopy walkway” som byggts 40 m ovan mark i syfte att besökare ska kunna se något av trädtopparna och dess invånare. Redan i gryningen hörs det sällsamma lätet från *Rufous-sided Broadbill*. Vi tar en liten omväg för att försöka se den. Robert vet var han ska leta och snart kan vi med tubkikare se alla dräktdetaljer samt hur brednäbben framställer vibrationsljudet med vingarna under snabba cirkulära luftfärder.

Den svajiga hängbron mellan plattformarna på canopy walkway är inte helt lätt att forcera, åtminstone inte med stil, och vi hoppas innerligt att hållbarheten testas regelbundet. Även om man inte på förhand tror sig vara höjdrädd kittlar det lätt i magen att se lövverket breda ut sig långt *under* fötterna. Väl ute på den första plattformen placerar vi oss runt den bastanta trädstammen och ser vad som dyker upp i träden. Såväl fåglar som tiden flyger förbi och innan vi vet ordet av har 4½ timme passerat. Men då har vi också fått en respektabel artlista med bl a *Red-fronted Parrot*, *Yellow-billed Turaco*, *Black Bee-eater*, *Rosy Bee-eater*, *Cassin’s Spinetail*, *African Emerald Cuckoo*, *Blue Malkoha*, *Yellow-footed Honeyguide*, *Melancholy Woodpecker*, *Yellow-spotted Barbet*, *Yellow-throated Tinkerbird*, *Forest Penduline-Tit*, *Golden Greenbul*, *Chestnut-capped Flycatcher*, *Sabine’s Puffback*, *Sharpe’s Apalis*, *Yellow-browed Camaroptera*, *Rufous-crowned Eremomela*, *Grey Longbill*, *Violet-backed Hyltiota*, *Ussher’s Flycatcher*, *Little Grey Flycatcher*, *West African Batis* och *Preuss’s Weaver*. Kl 11 har värmen stigit och svettbinas utforskning av näsborrar, ögon och öron irriterar allt mer. Då känns det lagom att sikta mot lunch och att försöka smälta intrycken. Det tar dock en stund att komma tillbaka till parkeringen, delvis p g a fin obs på *Western Forest Robin*.

Lunch och siesta på Rainforest Lodge kl 13-15, varefter vi återvänder till nationalparken. *Yellow-whiskered Greenbul* exponerar sig efter en stunds spanande och adderar sig till dagens totalt 13 arter bulbyler/grönbullar. Aktiviteten på canopy walkway är betydligt lägre nu (och den sista turistgruppen passerar snart), så vi får en lugn stund med fina

vyer över skogen från plattform 3. En *Long-tailed Hawk* väcker berättigad uppståndelse när den kommer glidande under oss och landar inom synhåll. Detsamma gäller den funkiga *White-crested Hornbill*. Fina obsar också på *Fire-bellied Woodpecker*, *Red-headed Malimbe* och *Yellow-mantled Weaver*. En grupp *Brown-necked Parrots* passerar och vi kan bevittna märkbart kvällssträck av *ladusvala* samt *Violet-backed Starling*.

Vi stannar till mörkrets inbrott och vandrar sedan tillbaka. Märkliga läten hörs från *Demidoff’s Galago*, och *Western Tree Hyrax* skriker som stuckna grisar (eller spädbarn). Parkeringen lysas upp av eldflugor. Ugglorna är inte på humör, så vi får nöja oss med *Potto*.

Artgenomgången visar att vi kommit upp i 200 arter på två skåddardagar.




Kakaofrukt.

Foto: Daniel Bengtsson

Tisdag 8 januari

Medan det ännu är mörkt springer en *Emin’s Pouched Rat*¹ framför bilen och blir dessvärre ”bush meat” som plockas upp av bakomvarande fordon. Vägen till Antwikwaa (utkanten av Kakum NP) indikerar få besökare och visar tydliga spår av att det kan forsa rikligt med vatten under regnperioderna (mars–juli och september–oktober). Väl framme promenerar vi längs en stig genom delvis uppodlade marker och glesare skog med arter som når ut i sekundärbiotoper. *Black Bee-eater* sitter alldeles vid stigen, *Long-tailed Hawk* glider förbi och landar kort framför oss, ett par *African Grey Parrots* passerar över, *Superb Sunbird* gnistrar vackert på nära håll och *Hairy-breasted Barbet* visar upp sig. Fruktbärande träd bjuder på *Melancholy Woodpecker*, *Finsch’s Flycatcher-Thrush*, *Western Nicator*, *Swamp Greenbul*, *Blue-throated Brown Sunbird* samt *Vieillot’s Black* och *Preuss’s Weaver*.

¹ Jättepåsrått är nattaktiva och kända för att kunna tränas till att med sitt utmärkta luktsinne detektera landminor (deras vikt utlöser inte minorna) samt identifiera positiva tuberkulosprover mycket snabbare än vad en människa kan med mikroskop.



African Grey Hornbill, hane. Arten är tämligen allmän i guineasavannbältet.

Foto: Magnus Westerlind

Längre fram ses *African Forest-Flycatcher*, *Red-thighed Sparrowhawk*, *Black-necked Weaver*, *Woodland Kingfisher*, *Klaas's Cuckoo*, *Red-rumped* och *Yellow-throated Tinkerbird*, *African Yellow White-eye*, *Blue-spotted Wood-Dove* och *Olive-bellied Sunbird*. När *Congo Serpent-Eagle* hörs blir det riktigt spännande. Några får se en skymt av örnen när den snabbt drar över stigen. Vi smyger genom en kakaoplantage² för att om möjligt få bättre sikt åt det håll som den ropar. Det ger ytterligare en snabb skymt, men inte för alla. Till slut får vi ge upp och återvända mot bussen. Klockan är 10 och temperaturen har stigit till 32 grader. Några män och kvinnor har passerat oss ett par gånger med korgar fulla av kakoböner³.

Vid Ntefrewa So häckar *Preuss's Swallows* i en vattentrumma under vägen. Där ses även *Little Bee-eater*, *Red-necked Buzzard* samt talrika *African Monarchs*. Efter ytterligare en kort transport når vi en stor bro vid Twifo Praso. Därifrån beskådas de exklusiva och vackra arterna *Rock Pratincole* och *White-throated Blue Swallow*, liksom den mindre spektakulära *Cassin's Flycatcher*. En strid ström av människor uppfattar oss tydligen som prospektörer för att utföra brönderhåll.

Lunch och siesta likt gårdagen. Därefter skådar vi i Abrafo Forest (på andra sidan av huvudvägen gen-

temot Kakum NP). Första biten påminner något om en lövsal, där varken *Black Dwarf Hornbill* eller *Chocolate-backed Kingfisher* står att finna. *White-tailed Alethe* är mer responsiv. Den sjunger inom längdhoppsavstånd men är likväl inte lätt att få syn på. Längre bort svarar *Red-billed Dwarf Hornbill* ihärdigt på Roberts play-back utan att vilja lämna sin position. Från en liten glänta ses *Blue-throated Roller* och *Copper-tailed Starling*. När skymningen närmar sig gör vi halt. *Little Green Woodpecker* födosöker diskret på en gren, medan en högljudd grupp *Great Blue Turacos* med lätthet väcker ett helt kompani, dock utan att exponera sig mer än nödvändigt. *Black-casqued Hornbill* ropar på avstånd. När det skymmer provar Robert att spela *Fraser's Eagle-Owl*. Det dröjer inte länge förrän en majestätisk silhuett kommer glidande och landar i ett stort träd ovan stigen. Mörka ögon och streckad buk (artsklijande karaktärer gentemot *Akun Eagle-Owl*) ses tydligt i tubkikare – helt klart en av dagens tacknämligaste obsar! Våra lätta steg tillbaka i mörkret ackompanjeras av ropande *African Wood-Owl*.

Välbehövlig dusch och buffémiddag väntar som vanligt vid lodgen. Äntligen är också den omtalade *tornguglan* på plats på takbjälkarna. Även denna kan därmed beskådas väl med strålkastare och tub.

Onsdag 9 januari

Skådning längs vägen i utkanten av Abrafo Forest fram till kl 10. Visselvirtuosen *Blue-shouldered Robin-Chat* håller vacker grynningsskoncert, dock med störande högtalarutrop från närliggande byar. Inne bland snåren under ett gigantiskt bambubuska-ge skulkar *Puvel's* och *Brown Illadopsis*, *Red-cheeked Wattle-eye* samt *Sooty Boubou*, varav den spektakulära flikflugsnapparen visar upp sig bäst.

² Tillsammans med guld var kakao den viktigaste exportvaran fram till år 2010, då olja började utvinna i stor skala. Ghanas BNP-tillväxt blev året därefter en av de högsta i världen och landet uppraderades från låginkomstland till lägre medelinkomstland.

³ Kakaoböner är kärnor från frukten av kakaoträdet (*Theobroma cacao*), som är en malvaväxt. Frukterna växer direkt på stammen eller grova grenar. Kakao härstammar från Sydamerika och introducerades till Europa sedan spanjorerna erövrade Mexiko på 1500-talet.



White-throated Bee-eater var talrik under resan men visade sig bäst sista kvällen. Foto: Daniel Bengtsson

Att observera *Puvel's Illadopsis* rakt underifrån och nästan 10 m upp känns något udda. *Yellow-rumped Tinkerbird* och *Blue Malkoha* har vi också i bagaget när vi traskar vidare.

När vi rundar en kurva flyger ett par *Black-bellied Seedcrackers* upp bredvid vägen, men är sedan som uppslukade av vegetationen. *Red-necked Buzzard*, *Whistling Cisticola*, *Red-vented Malimbe* och *Simple Greenbul* är mer exponeringsvilliga. Längre fram får vi fina obsar på *African Pygmy Kingfisher*, *Tit-Hylia*, *Red-tailed Greenbul* och *Crested Malimbe*. Framme vid stigen in i skogen kan sjungande *Lemon-bellied Crombec* beskådas i tub, vilket kan behövas för en så liten fågel. Vi går in i lövsalen men får samma utdelning som igår, dvs ingen *Black Dwarf Hornbill* eller *Chocolate-backed Kingfisher*, och *Red-billed Dwarf Hornbill* vägrar komma närmare. Avslutningsvis får vi i alla fall fina obsar på 35 *Rosy Bee-eaters* ute vid vägen.

Frampå förmiddagen besöker vi Cape Coast Castle, ett världsarv som ursprungligen (1653) byggdes av svenskar för att skeppa ut timmer, guld och elfenben. Det kom sedermera att användas för omfattande slavhandel⁴. Lunchen intas med havsutsikt alldeles bredvid slottet, så att *kungstärna* och *bredstjärtad labb* kan adderas till listan. Färden fortsätter västerut längs kusten, bl a förbi det närliggande slavfortet Elminia Castle. På bra vägar når vi D & A Guest House i Shama kl 14.

En timmes transport till Nsutu Forest innebär något senarelagd start på eftermiddagsskådningen,

⁴ Det uppskattas att 8 miljoner slavar passerade genom de mörka hålorna och "the gate of no return" ut till skeppen som förde dem över Atlanten.

som ändå hinner bjuda på åtskilliga godbitar. Vi promenerar längs vägen genom den relativt öppna skogen av sekundärbiotopkaraktär. Relativt omgående får vi fint möte med *Black Dwarf Hornbill*, kontinentens sannolikt svåraste hornkorp. *Piping Hornbill* är talrik och vi får bra obs på *Brown-cheeked Hornbill*. En annan höjdpunkt är *Chestnut-bellied Helmet-Shrike*. *Blue-throated Rollers* företar spektakulära luftfärder och fyra *Narrow-tailed Starlings* passerar över. Skymningen bringar *Hammer-headed Bats* på vingarna och långt bort hörs det säregna lätet från *Nkulengu Rail*. Till slut får vi äntligen höra *Akun Eagle-Owl*.

Efter middag och artgenomgång kan konstateras att vi haft >100 arter varje dag hittills, totalt nära 270 på 4 skåddardagar.

Torsdag 10 januari

Morgon i Nsutu Forest. Vi börjar med sittande *Red-chested Goshawk*. När dimman lättar framträder färgerna bättre på *Western Bronze-naped Pigeon* och de intensivt blå inslagen i fjäderdräkten hos *Black-Bee-eater* gnistrar intensivt i morgonsolen (vilket föranleder förslaget "Blue-spangled Bee-eater" till nästa namnrevidering). Skådningen fortsätter med *Square-tailed Saw-wing*, *Bristle-nosed Barbet*, *Sabine's Spinetail*, *Black-capped Apalis*, *Red-billed Dwarf Hornbill* (äntligen!), *Little Grey Greenbul* samt *Giant Forest Squirrel*. Vid 10-tiden transport vidare västerut.

Lunch i Takoradi och sedan ytterligare 1½ timmes bussfärd. En vattensamling bredvid vägen nära Nkroful ger *purpurhäger*, *African Pygmy-Goose* och *Orange Weaver*. Kl 14.30 når vi Ankasa Conservation Area, där vi måste åka 4-hjulsdrivna jee



Giant Kingfisher, hanne.

Foto: Magnus Westerlind

par ganska långt in i den täta skogen för att komma till vattenhålen där specialarna *Hartlaub's Duck*, *African Finfoot*, *Shining-blue* och *White-bellied Kingfisher* samt *Dwarf Crocodile* finns. *Red-thighed Sparrowhawk*, *Congo Serpent-Eagle*, *Chestnut-breasted Nigrita*, *Western Forest Robin* och *Woodland Kingfisher* ses ”i förbifarten”, liksom spår av *skogsselefant*.

Vi åker/promenerar tillbaka till en camp mitt ute i skogen, där vi bjuds välförtjänt kalla drycker. En god afrikansk buffé dukas upp medan den afrikanska natten sluter sig omkring oss. *Western Tree Hyrax* förstärker den exotiska stämningen. Kort lys(s)ning efter middagen ger *African Palm Civet*. En av jeeparna havererar, men 11 personer i en Land Rover är inga problem. Hotellet i Half Assini, 4 km från Elfebenskusten, nås kl 22. För den som är orolig att vi börjar bli solbrända tillhandahålls ”skönhetstvål som bleker hyn”.

Fredag 11 januari

I brist på hotellservice får Robert agera kock så att vi sånär kommer iväg kl 05 som planerat⁵. Skådning i primärregnskogen Ankasa kl 6-11, där cikadorna är öronbedövande redan i gryningen. Biotopen är svårskådad och till att börja med ser vi mest skymtar av *Red-tailed* och *Grey-headed Bristlebill*, *Rufous-winged Illadopsis* samt *Blue-headed Wood-Dove*. De talrika *Icterine Greenbul* samt *Collared* och *Fraser's Sunbird* bjuder i alla fall på bättre obsar, vilket senare även gäller *Red-tailed Green-*

bul, *Finsch's Flycatcher-Thrush*, *Chestnut Wattle-eye*, *Red-bellied Paradise-Flycatcher*, *Maxwell's Black Weaver* och *Forest Wood-Hoopoe*. Jeepen som havererade igår är fortfarande livlös och får bogseras. Först på tillbakavägen får vi kontakt med den eftertraktade *Yellow-bearded Greenbul*, som vi bara har chans på här. *Shining Drongo* blir sista tillskottet innan vi lämnar Ankasa.

När vi närmar oss Nkroful stannar vi vid ett träd med rikliga blommor på bar kvist. Där huserar *Olive-bellied*, *Buff-throated*, *Superb*, *Blue-throated Brown*, *Johanna's* och *Western Olive Sunbird*. Ute i mangroveterräng vid Amansure adderas sedan *Mouse-brown* och *Reichenbach's Sunbird*. Tankstopp genererar en koloni med *Village*, *Orange* och *Viellot's Black Weaver*. Sedan vidtar transport tillbaka österut mot Cape Coast genom plantager med oljepalmer, bananer och gummi.

På sena eftermiddagen hinner vi med en dryg timmes skådning längs vägen ut mot Brenu Beach. Vi kompletterar dagens solfågellista till imponerande tolv arter med *Splendid* och *Copper Sunbird*. *Red-winged Warbler* visar upp sig och resans enda *Yellow-mantled Widowbirds* noteras.

Vi ankommer till den nu välbekanta Rainforest Lodge redan kl 18.30. Reslistan landar efter sex skåddagar på nära 300 arter.

Lördag 12 januari

För tredje dagen i rad intas frukost kl 04.30. Därefter har vi nästan två timmars transport till Aboabo Forest, som kan sägas vara en nordlig utlöpare till Kakum NP. Det blir full fart direkt med *Yellow-billed Barbet*, *Forest Penduline-Tit* samt åtskilliga

⁵ Det bör sägas att, i synnerhet med afrikansk standard, tiderna generellt hölls extremt bra under hela resan.

”flugsnappare” i form av *African Forest-Flycatcher*, *Grey-throated Tit-Flycatcher*, *Red-bellied Paradise-Flycatcher*, *Blue-headed Crested Flycatcher* samt *Chestnut-capped Flycatcher*. Dimman ger inte riktigt rättvisa åt fjäderprakten hos *Blue Cuckoo-Shrike*. *Rufous-crowned Eremomela* uppträder som vanligt i flock, medan en grupp *Black Cuckoos* (5 ex) känns betydligt mer udda. Vi ser vidare *White-headed Wood-Hoopoe*, *Little Grey Flycatcher*, *Black Spinetail* och *Brown-cheeked Hornbill*. *Yellow-throated Cuckoo* och *African Piculet* hörs tyvärr enbart.

Lunch intas i Assin Fosu. Restaurangens tronliknande stolar är av format som får t o m Thomas att dingla med benen, vilket sannolikt inte hänt sen lägre skolåldern. De ”guldtallrikar” (av plast) vi vant oss vid är utbytta mot vita med förgyllda kanter. 1½ timme senare har vi svängt av österut i New Adubiase och kommer så småningom till byn Bonkro.

En månghövdad barnaskara vill hälsa på oss så fort vi kliver ur bussen. Sedan samlar vi oss för resans mest framemotsedda exkursion. En av byns jägare ledsagar oss på små stigar ut i skogen, hela tiden balanserade en vattenflaska på huvudet. Även när vi böjer oss under djupt nedhängande grenar eller går i branta sluttningar tycks flaskan sitta klistrad mot huvudsvålen, sannolikt en anpassning för att alltid ha händerna fria vid jakt. Robert ser en *spottkobra* slingra över stigen. Det dröjer dock inte många minuter förrän vi ser ytterligare en, vilket får oss att undra hur många som passerat osedda... *Green Tree Snake* slingrar elegant iväg i ögonhöjd. Fågelmässigt är det tämligen lugnt i skogen. Mest uppseendeväckande är *Yellow-footed Honeyguide* som hörs uppfifrån trädkronorna.

Efter nära en timmes vandring går vi brant uppför den sista sluttningen till målet, en lodrät klippvägg där dryga dussinet märkligt murade fågelbon sitter fästa. På behörigt avstånd har två enkla bänkar placerats i sluttningen. Vi tar plats på dessa och väntar. De erfarna guiderna tar tillfället i akt för en rejäl tupplur, och nog tycktes även någon deltagares haka sjunka misstänkt djupt... En timme förflyter utan att egentligen någonting händer. Ytterligare en halvtimme därefter är kl 17 och skymningen börjar anas. Plötsligt tycks något röra sig inne bland stammar och rötter. Var det inbillning? Nej, där kommer något hoppande i riktning mot klippan. Med tanke på det höga prassel vi framkallar av att flytta tyngdpunkten från en fot till en annan, är det förvånansvärt att de kraftfulla skutten förefaller helt ljudlösa. Snart når rörelsen klippan och en besynnerlig varelse uppenbarar sig: *Yellow-headed Picathartes*, en av Afrikas mest eftertraktade fåglar! Den har kommit för att övernatta i sitt bo på den klippa som sannolikt hållit en population under mycket lång tid. Snart får den sällskap av fler artfränder, vilket leder till en euforisk halvtimme då de

diskret visar upp sig under vaksam rekognosering av omgivningen närmast bopplatsen. Vi bjuds således på en av de mest fantastiska ornitologiska upplevelser denna världen har att erbjuda, åtminstone enligt undertecknad.

På små lätta moln svävar vi tre kvart tillbaka till bussen, där barnaskaran tacksamt tar emot alla dricksflaskor vi kan avvara. (Häriifrån är det långt till de välbärgade kvarteren i Accra.) Som väl är har man insett nödvändigheten i att stödja lokalbefolkningen och låta dem få del av de inkomster vi som besökare inbringar. Ett särskilt projekt, Positive Footprints, har upprättats för att bli en del av barnen i de tre byarna närmast Picathartes-häckplatsen utbildning de annars skulle sakna. På så vis medför fåglarnas fortsatta existens fördelar för lokalbefolkningen, som då motiveras att skydda dem från hot som störning, skogsavverkning och jakt⁶.

Kvällstransport (2½ timme) till Kumasi, huvudstad i regionen Ashanti, vidtar. Middag serveras kl 22, dvs 10½ timme efter lunch (tidigare längsta matintervall var 10 timmar mellan frukost och lunch...). Som kompensation utlovas sovmorgon till frukost kl 07 imorgon bitti.

Söndag 13 januari

Främst en transportdag då det tar ca 8 timmar att köra de 45 milen till Mole National Park i nordväst. Längs vägen passerar vi bl a en gräsbrand som når vägkanten. Även i relativt hög hastighet är värmepåslaget kraftigt. Att passera långsamt eller utan heltäckande fordon vore direkt hälsofarligt, för att inte säga omöjligt. *Kohägrarna* som spanar undflyende djur att spisa verkar dock obekymrade inför detta. Lunch i Kintampo kl 11.30. Att staden utgör något av Ghanas mittpunkt är påtagligt, då antalet bussar och människor som på kort tid rastar på samma plats som vi är stort. Maten är mindre imponerande, i synnerhet den spaghetti bolognese som tycks innehålla kyckling...

När vi passerar floden Svarta Volta (som liksom systerfloden Vita Volta mynnar ut i den 8500 km² stora Voltasjön, en av världens största konstgjorda sjöar) har vi definitivt kommit in i en torrare klimatzon, där 27 grader känns tämligen svalt. Biotopen utgörs av guineasavann, vilket bekräftas av arter som *Dark Chanting Goshawk*, *Grasshopper Buzzard*, *Bateleur*, *Namaqua Dove* och *Rufous-crowned Roller*. Befolkningen är i högre grad muslimer som bor i runda hyddor och livnär sig på boskapsskötsel. Då vi lämnar huvudvägen har vi kört >80% av den totala sträckan, men den ihåliga vägen in till nationalparken tar ändå nästan en tredjedel av körtiden i anspråk. Den bjuder i alla fall på resans enda observation av *Piapiac* och möjlighet att stanna för att kika på ett par av närmast ovan

⁶ AviFaunas fågelskyddsfond beslutade i mars 2013 att tilldela projektet 5000 \$.

nämnda arter som hastigt passerade i revy längs med huvudvägen.

Kvart i fem når vi lodgen, som enligt broschyren stoltserar med norra Ghanas enda swimmingpool och som ska bli vår boning kommande tre nätter. I kvällningen överblickas de delar av den 4577 km² stora nationalparken som breder ut sig närmast nedanför platån som lodgen är belägen på. *Bush-buck* och *Buffon's Kob* besöker vattenhål, som också verkar hysa åtskilliga *nilkrokodiler*. Bland fåglar kan nämnas *Helmeted Guineafowl*, *Woolly-necked Stork*, *Dwarf Bittern* (!), *Senegal Thick-knee*, *Bruce's Green Pigeon*, *Northern Red-billed Hornbill*, *Giant Kingfisher*, *Red-throated Bee-eater*, *Northern Crombec*, *polyglottsångare* samt *Beautiful* och *Pygmy Sunbird*.

Måndag 14 januari

Klar och kylig natt (13 grader) med ropande *African Scops-Owl* och *Greyish Eagle-Owl* alldeles utanför, närmare gryningen dock överröstade av böneutropare. Vi tar oss med bussen till en skogsriå i anslutning till vatten. I rask takt ses *halsbandsparakit*, *Grey-headed Kingfisher*, *Grey* och *Cardinal Woodpecker*. Men föreställningen stjäls av ett par *Oriole Warblers*, som hoppar mycket förtroligt precis framför oss. Diverse tättingar kommer till små vattensamlingar för att dricka i morgonsolen, däribland *Pin-tailed Whydah*, *Wilson's Indigobird*, *Orange-cheeked* och *Lavender Waxbill*. *Grey-headed Bush-Shrike* bjuder på vacker uppvisning, medan *rallbeckasin* och *Giant Kingfisher* visar sig mer hastigt, liksom en förbiflygande hane *Togo Paradise Whydah*. *African Golden Oriole* samt *Long-tailed* och *Bronze-tailed Glossy-Starlings* är också nya.

Vi promenerar en bit längs vägen ut i trädsavannen, där *Abyssinian Roller*, *Northern Red-billed Hornbill* och en adult *stridsörn* röner berättigad uppmärksamhet. Från ett bekvämt gömsle kan vi i lugn och ro skåda ut över ett större vattenhål med omkringliggande öppen yta (som säkerligen översvämmas under regntiden), och uppemot lodgen på höjden. *Malachite Kingfishers* spanar från vasstrån och *Wire-tailed Swallows* jagar över vattenytan. En hona *sadelnäbbstork* kommer inflygande och parkerar på andra sidan, där *Senegal Thick-knees* samt *Spur-winged* och *African Wattled Lapwings* redan finns. Gamar börjar skruva upp och vi kan räkna in såväl *Hooded* som *White-backed*, *Rüppell's* och *White-headed Vulture*. *Buffon's Kob* och vårtsvin med kultingar kommer för att dricka, men annars blir aktiviteten allt lägre med stigande värme. Desto mer aktion hos en grupp *anubisbabianer* vi stöter på under färden tillbaka mot lodgen. I synnerhet en hona vars unge är lite sen ner från trädet blir rejält uppgjagad. Hon skäller och gör utrusningar mot bussen för att tilldra sig uppmärksamheten och ge sin unge chansen att komma i säkerhet. En grupp

Green Wood-Hoopoes (resans enda!) och ett ståtligt par *Abyssinian Ground Hornbills* blir lagom avslutning innan lunch.

Från utsiktsplatsen kan vi konstatera att en *stäpp-elefant* nu kommit fram till vattenhållet framför gömslet. Detsamma gör ett flertal *White-headed Vultures* och *Grasshopper Buzzards* på lite närmare håll. Dagens siesta/rovfågelspan blir tämligen händelsefattig, men ett tiotal *gycklarörnar* (nästan uteslutande ungfåglar) samt *Bearded Barbet* som besöker ett fikonträd bör nämnas.

Eftermiddagsturen i parken går till att börja med genom slutna trädsavann. En *Yellow-billed Oxpecker* på *Roan Antelope* blir faktiskt resans enda oxhackare. *White-breasted Cuckoo-Shrike* skymtar också förbi. Ute på mer öppen mark (hårda röda grusfält) letar vi *Forbes's Plover* utan framgång. För att komma till nästa potentiella piparlokal plöjer vi genom den nyligen brända terrängen⁷, vilket sätter tydliga spår på nytvättade byxor. Värmen är påtaglig och de enormt talrika (och uppenbarligen svältfödda) svettbina kan driva även den lugnaste person till vansinne när de svärmar runt/i ögon, näsa, mun och öron. Börje, som gått mångårig knottutbildning, är dock oförsäkrat oberörd, liksom Eva i sin huvudbonad med nät för ansiktet. Tre ljudliga *Fine-spotted Woodpeckers* får oss att glömma plågorna för en liten stund. Vidare ses *Sun Lark*, *Rufous* och *Singing Cisticola* samt en snygg hane *Exclamatory Paradise Whydah*.

Alldeles i skymningen stannar vi för att gå ner till ett vattenhål. Det låter måttligt inbjudande, då Robert och Emmanuel varnar för talrika och elaka bromsar. *African Scops-Owl* utgör i alla fall viss lockelse, så vi tar ett djupt andetag och lämnar bussens trygga och svala miljö. Bromsarna verkar emellertid ha stämplat ut för dagen och nere vid vattnet piggar *Swamp Flycatcher* upp humöret. Plötsligt kommer Robert springande för att han sett *Pel's Fishing-Owl*⁸. Denna närmast mytomspunna art har stor men lokal utbredning och ses sällan (utom på säkra lokaler som exempelvis Victoriafallen). Tidigare var den regelbunden här, men nu var det tre år sen Robert senast såg någon. Med hög puls följer vi snabbt efter. Något olyckligt har den landat närmare än väntat, varpå den åter flyger iväg utan att alla hinner se. I andra änden av det långsmala vattenhållet hindras vi att fortsätta av tät vegetation. Robert försöker locka tillbaka ugglan med play-back, vilket förefaller mindre framgångs-

⁷ Även inne i nationalparken skapas avsiktliga bränder, eftersom djuren annars riskerar att lockas ut till det färskgräs som snabbt växer upp där boskapsskötare bränt ytor utanför skyddad mark. Då är djuren inte längre fredade och hamnar i grytan.

⁸ Arten är namngiven efter Hendrik Severinus Pel, holländsk guvernör för Guldkusten (numera Ghana) mellan 1840 och 1850.

rikt. Men plötsligt kommer en stor skugga inflygande och landar i ett träd på andra sidan vattenhållet. Det är fortfarande dugligt obsljus och vi ser tydligt hur de stora mörka ögonen stirrar hemlighetsfullt på oss. När den så småningom flyger iväg lyser hela fågeln vackert rödbrunt. I nästan samma ögonblick passerar *Standard-winged Nightjar* över vattenhållet, och direkt därefter kommer *African Scops-Owl* till trädet bakom oss. Allt detta inom ett par minuter och med ens är stämningen på topp. Vilken uppryckning efter alla vedrödor med elaka insekter och fåglar som inte ville visa sig! Längs vägen tillbaka ses såväl *Standard-winged* som *Long-tailed Nightjar* i bussens strålkastarsken. Närmare lodgen springer *African Civet* på vägen.

Tisdag 15 januari

På väg till Mole River stannar vi för en nyligen överkörd *Standard-winged Nightjar*. Vi kan konstatera att det är den näst innersta handpennan⁹ som är kraftigt "förväxt" och bildar de "vimplar" som gett arten dess svenska namn (och som i mörker kan förväxlas med efterföljande fladdermöss). Framme vid flodravinen råder livlig morgonaktivitet. I tämligen rask takt beskådas *Green-headed Sunbird*, *Square-tailed Drongo*, *African Golden Oriole*, *Yellow-throated Greenbul*, *African Moustached Warbler*, *Red-shouldered Cuckoo-Shrike*, *Sulphur-breasted Bush-Shrike* samt en vit hane *African Paradise-Flycatcher*. En flock med åtta *Red-headed Lovebirds* pilar förbi, liksom tre något sävligare *Brown-necked Parrots*. Vid rotvältor nere vid flodfåran, där vattnet nu är åtskilliga meter under den nästan ofattbara nivå som nås under regntid, hoppar *Snowy-crowned Robin-Chat*.



"Campinggris".

Foto: Daniel Bengtsson

Vi följer flodens trädrida en bit. *Northern Carmine Bee-eater* väcker berättigad uppmärksamhet och vi får chansen att särskilja *Red-chested Swallow* från *ladusvala*. Ett litet fågeltåg i vegetationen runt ett

⁹ Även hos *Pennant-winged Nightjar*, den andra medlemmen i släktet *Macrodipteryx*, är det näst innersta handpennan som utgör ornament.

uttorkat vattenhål, i skuggan av de höga träd som kantar floden, innehåller bl a *Red-headed Weaver* samt *Lead-coloured* och *African Blue Flycatcher*. Att vissla *Pearl-spotted Owlet* är ett beprövat knep för att locka fram småfåglar i Afrika (söder om Sahara). Det fungerar givetvis också för att få fram ugglan själv, vilket bekräftas av en morsk liten krabat som kikar ner på oss. En större vattensamling hyser inga sensationer, men över densamma skruvar i alla fall ett par *Wahlberg's Eagles*, vilka faktiskt blir resans enda *Aquila*-örnar. På väg tillbaka ses *Brubru*, och i väntan på att Appiah ska avsluta busstvännen kommer snygga *Violet Turacos* för att dricka. Siestan bjuder på badande och trumpetande *stappelefanter*, orädda "campinggrisar" (vårtsvin) samt en yngre *stridsörn*.

Temat för eftermiddagen är brunt: *Brown Babbler*, *Northern Red Bishop* (honfärgade), *Brown Snake-Eagle* och *Spotted Thick-knee*. Lite mer vilja krävs kanske för att placera in *Striped Kingfisher* i samma kategori och med *White-fronted Black-Chat* blir det i princip omöjligt. Skymningen är nådig med sjunkande temperatur och avtagande aktivitet hos svettbina. Liksom igår uppbringas också ornitologiska höjdpunkter. *White-throated Francolin* exponerar sig öppet i jakt på en förmodad inkräktare och när mörkret snart lägger sig lyfter en ljudlig *Forbes's Plover*. Vi summerar resans artrikaste dag med 131 arter och har nu passerat 400 totalt.

Onsdag 16 januari

Mestadels en transportdagdag tillbaka till Kumasi, men vi börjar med en timmes (frivillig) skådning innan frukost. Börje lyckas med konststycket att återfinna den *Dwarf Bittern*¹⁰ han upptäckte första kvällen här, men då hann det bli mörkt innan alla fått syn på den. De som inte är närvarande tillkallas omgående och även om avståndet är stort kan den mörka lilla figuren tydligt ses smyga omkring i ett litet dike med rinnande vatten. Efter frukost lämnar vi Mole NP, men hinner först lägga *Familiar Chat* till listan.

Alldeles utanför nationalparken ligger byn Larabanga med en av Västafrikas äldsta moskéer från 1421. På den saudiske grundarens grav växer nu ett >500 år gammalt baobabträd. När löven fallas samlas de ihop och delas i en fredsbringande ceremoni mellan klanerna i området. Vackert uppradade *Red-chested Swallows* häckar sannolikt också i byn med 4000 invånare, varav 200 får plats i moskén. Sedan vidtar den långa färden söderut. På många platser vajar regeringspartiets flaggor efter presi-

¹⁰ Under regntiden ska den inte vara särskilt svår i Ghana, men då den är en intra-afrikansk flyttare har många nu lämnat regionen. Det tog för övrigt undertecknad 17 resor till Afrika söder om Sahara att se arten, så Tack Börje! ☺



Moskén i Larabanga.

Foto: Daniel Bengtsson

dentvalet i december¹¹. *Speckled Pigeon* noteras i två byar och vi passerar väg-/broprojekt under kinesiskt överinseende, en numera tämligen vanlig syn i denna del av Världen. Lunchen i Kintampo kommer snabbare på bordet när vi förbeställt.

Några timmar senare är vi framme i tvåmiljonstaden Kumasi, Ghanas näst största stad efter Accra. Samling till artgenomgång kl 18, med avbrott för middag en halvtimme senare.

Torsdag 17 januari

Straw-coloured Fruit Bats beskådas i Royal Basins hotellträdgård innan frukost. Kl 6.20 är vi på plats i Bobiri Forest (5000 ha), tre mil sydost Kumasi. Nu är vi åter i högstammig guineaskog med chans på många fina arter. Vi går långsamt längs vägen och ser vad som dyker upp. En av höjdpunkterna är den

snygga *Narina Trogon* som visar sig fint, en annan den svåra *Thick-billed Cuckoo*. I övrigt kan *Red-tailed Bristlebill*, *Tit-Hylia*, *Chestnut-capped Flycatcher*, *Yellow-mantled Weaver*, *Preuss's Weaver*, *Red-headed Malimbe*, *White-crested Hornbill*, *Buff-spotted Woodpecker*, *Sharpe's Apalis*, *Ansorge's Greenbul* och *Johanna's Sunbird* nämnas. Framme vid anläggningen, som bl a rymmer gästhus och fjärlsuppfödning, visar sig *Red-billed Dwarf Hornbill* och *Forest Wood-Hoopoe*. Vi fortsätter ytterligare en liten bit och hör *Afep Pigeon* samt *Least Honeyguide* (båda nya för resan), men annars börjar det vara ganska avslaget. Vi stiger upp i bussen och siktar in oss på lunch ett par timmar bort. Men inte ens med den uppladdningen orkar vi, bortsett Magnus, få i oss de gigantiska pizzor som serveras.

Eftermiddagsskådning vid foten av Atewa Range, där vi mest rör oss i jordbruksmark. Det är rejält varmt när vi anländer kl 14.30. Värmen verkar dock inte bekomma *Black-and-white Shrike-Flycatcher* som utför flitig sångflykt. Även *Klaas's* och *Diederek Cuckoo* är aktiva. Precis som den senare är *Pale Flycatcher* och *Compact Weaver* nya, och vi får resans bästa obsar på *Little Bee-eater* samt *Grosbeak Weaver*. Vi går en bit upp i skogen men vänder snart tillbaka och tillbringar kvällen i den mer öppna biotopen nedanför. Två *African Cuckoo-Hawks* flyger över och *Western Bluebill* smiter som vanligt in i tät vegetation. Slutligen ses *Tit-Hylia* och *Marsh Tchagra*. På väg till Koforidua passerar vi ett ensamt träd med oräknliga *Straw-coloured*

¹¹ Makten har länge växlat mellan det socialdemokratiska partiet Nationella demokratiska kongressen (NDC) och det marknadsliberala Nya patriotiska partiet (NPP). I 2008 års val fick NDC regeringsmakten samtidigt som dess ledare John Atta Mills valdes till president. I juli 2012 avled Mills hastigt, mindre än ett halvår innan han skulle ha kandiderat för att bli omvald. Istället valdes John Dramani Mahama (NDC) med knapp marginal till president efter att ha varit tillförordnad statschef sedan Mills död. Valmyndigheten gav Mahama 50,7 % av rösterna och främste rivalen Akufo-Addo 47,7 %. Oppositionen förkastade resultatet, men sedan landets Högsta domstol dömt till Mahamas fördel verkar oppositionen ha accepterat beslutet.

Fruit Bats (1000 ex är en grov gissning). Vår sista övernattningsplats blir på Linda Dor Hotel, som bl a har IKEA-klockor.

Fredag 18 januari

Sista dagen i Ghana börjar, liksom många andra, med frukost kl 04.30. Vi har sparat en av höjdpunkterna (i dubbel bemärkelse), då promenad upp till krönet av Atewa Range (850 m ö h) väntar, vilket lär bli den mest fysiskt ansträngande insatsen. Anledningen är Ghanas enda kvarvarande höglandsregnskog som bl a hyser den sällsynta *Blue-headed Bee-eater*. Det är tidig gryning när vi anländer och luften är fortfarande ganska sval. Så fort solen kommer upp stiger temperaturen, men efter hand som vi kommer uppåt slutningarna blir luften klarare och värmen inte lika påtaglig. Vi rör oss i tämligen rask takt för att nå krönet medan det fortfarande är hyfsad fågelaktivitet. (Den eftertraktade biätaren är emellertid solälskare och brukar inte exponera sig förrän frampå förmiddagen.) Således lyssnar vi främst och stannar bara för arter som av någon anledning är särskilt intressanta. *Green* och *Lemon-bellied Crombec*, *Yellow-browed* och *Olive-green Camaroptera* samt *Kemp's Longbill* låter alla höra sina respektive strofer. Med lite tålamod lyckas vi se de två sistnämnda för första (och sista) gången på resan. *Chocolate-backed Kingfisher* är också ny. Efter en lång stunds spanande hittas till slut den stillasittande juvelen som då lugnt kan beskådas i tub. *Green-tailed Bristlebill* och *White-tailed Alethe* bjuder på snabba obsar, men likväl de bästa hittills.

Tre timmar efter start är vi uppe på krönet. Tämligen omgående får vi kontakt med en divers fågel-

flock med bl a *Hairy-breasted Barbet*, *Red-rumped Tinkerbird*, *Black-winged Oriole*, *African Shrike-Flycatcher*, *Little Grey Flycatcher*, *Chestnut-capped Flycatcher*, *Buff-throated Sunbird*, *Green Hylia*, *Rufous-crowned Eremomela* samt *Black-capped Kingfisher* verkar attraherad av gemenskapen. Vid vändpunkten konstateras att honfärgad svartvit flugsnappare framifrån kan vara märkbart lik den svåra *Olivaceous Flycatcher*. Först sedan nervositeten blivit påtaglig finner vi dagens andra brunryggade skönhetsmålartern *Blue-headed Bee-eater*, på små grenar alldeles ovan stigen. Således går promenaden ner med lätta steg. Avslutningsvis ser vi *Red-faced Cisticola*, en art som normalt brukar vara påfallande bandspelaresponsiv, men som på denna resa vägrat visa sig trots åtskilliga försök. Tillbaka på hotellet följer dusch, ompackning och lunch. Avfärd kl 14.45 med siktet inställt på Accra Kotoka Airport. En bensträckare ("stake-out") längs med vägen ger rörhöna, *Black Crake* och *Allen's Gallinule* i en liten pöl. Sistnämnda blir sista tillskottet på artlistan, som därmed summeras till 424 arter på 13 skådadagar. Efter ca 300 mil i buss, checkar vi in för den avslutande flygresan hem till Norden, som påbörjas kl 22.

Lördag 19 januari

Hemresan går planenligt. Strax innan kl 06 landar vi i Amsterdam, varifrån vi så småningom ankommer våra respektive slutdestinationer. Förutom en timmes tidsskillnad noteras närmare 40 grader kallare temperatur. -Brrr!

Daniel Bengtsson



White-backed Vulture.

Foto: Daniel Bengtsson

Artlista fåglar

(H) = endast hörd; 21 st.

1. White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata* (Vithuvad visseland)
3 ex Nkroful 10/1, >15 ex Mole 14-16/1.

2. Hartlaub's Duck *Pteronetta hartlaubii* (Hartlaubs and)
2 ex Ankasa 10/1.

3. Northern Pintail *Anas acuta* (Stjärtand)
4 ex Sakumo Lagoon 6/1.

4. African Pygmy-Goose *Nettapus auritus* (Afriskansk dvärgand)
7 ex Nkroful 10/1.

5. Helmeted Guineafowl *Numida meleagris* (Hjälmpärlhöna)
57, 15, 15 resp. 3 ex Mole 13-16/1.

6. White-throated Francolin *Peliperdix albogularis* (Vitstrupig frankolin)
1 ex (hanne) Mole 15/1.

7. Ahanta Francolin *Pternistis achantensis* (Ahantafrankolin)
Minst 1 ex vardera Antwikwaa 8/1, Nsutu Forest 9/1 och Aboabo Forest 12/1. (H)

8. Double-spurred Francolin *Pternistis bicalcaratus* (Marockansk frankolin)
10 ex Shai Hills 6/1, 5 ex Winneba Plain 6/1, 3 ex Brenu Beach 11/1, 15 ex Mole 14-16/1.

9. Stone Partridge *Ptilopachus petrosus* (Stenvaktel)
5 ex Shai Hills 6/1, 3 ex Winneba Plain 6/1, 15 ex Mole 14-16/1.

10. Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* (Små-dopping)
5 ex Sakumo Lagoon 6/1.

11. Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus* (Ullhalsstork)
2 ex Mole 13-16/1.

12 Saddle-billed Stork *Ephippiorhynchus senegalensis* (Sadelnäbbstork)
1 hona Mole 14/1.

13. Long-tailed Cormorant *Phalacrocorax africanus* (Långstjärtad skarv)
300 ex Accra – Cape Coast 6/1, 20 ex Mole 14/1.

14. Hamerkop *Scopus umbretta* (Skuggstork)
2, 3, 5 resp. 3 ex Mole 13-16/1.

15. Dwarf Bittern *Ixobrychus sturmii* (Pygmérördrom)
1 ex (2k) Mole 13+16/1.

16. Grey Heron *Ardea cinerea* (Gråhäger)
Totalt 15 ex på 5 obsdagar.

17. Black-headed Heron *Ardea melanocephala* (Svarthuvad häger)
1 ex Mole 13+16/1.

18. Purple Heron *Ardea purpurea* (Purpurhäger)
1 ex Nkroful 10/1.

19. Great White Egret *Casmerodius albus* (Ägretthäger)
5 ex Sakumo Lagoon 6/1.

20. Intermediate Egret *Mesophoyx intermedia* (Mellanhäger)
Totalt 5 ex på 4 obsdagar.

21. Little Egret *Egretta garzetta* (Silkeshäger)
1 ex Sakumo Lagoon 6/1, 1 ex Assin Fosu 12/1.

22. Western Reef Egret *Egretta gularis* (Revhäger)
20 ex Sakumo Lagoon 6/1, 3 ex Amansure 11/1.
Någorlunda jämn fördelning mellan vit och svart morf.

23. Black Egret *Egretta ardesiaca* (Svarthäger)
10 ex Sakumo Lagoon 6/1, 1 ex Amansure 11/1.

24. Cattle Egret *Bubulcus ibis* (Kohäger)
Allmän; observerad samtliga dagar.

25. Squacco Heron *Ardeola ralloides* (Rallhäger)
Totalt 8 ex på 7 obsdagar.

26. Striated Heron *Butorides striata* (Mangrovehäger)
Totalt 8 ex på 5 obsdagar.

27. Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax* (Natthäger)
3 ex Mole 14/1.

28. Hadada Ibis *Bostrychia hagedash* (Hadadaibis)
5, 15, 10 resp. 5 ex Mole 13-16/1. Tillsammans med skrikhavsörn den fågel i Afrika som alstrar mest decibel!

29. African Cuckoo-Hawk *Aviceda cuculoides* (Afrikansk gökfalk)
2 ex Shai Hills 6/1, 1 ex Kakum 7/1, 2 ex Atewa Range 17/1.

30. European Honey-Buzzard *Pernis apivorus* (Bivråk)
1 ex Abrafo Forest 9/1, 2 ex Bobiri Forest – Atewa Range 17/1, 1 ex Atewa Range 18/1.

31. Black-winged Kite *Elanus caeruleus* (Svartvingad glada)
Totalt 7 ex på 3 obsdagar.

32. Yellow-billed (Black) Kite *Milvus (migrans) aegyptius* (Brun glada)
Allmän; observerad samtliga dagar.

33. African Fish-Eagle *Haliaeetus vocifer* (Skrikhavsörn)
1 ex (subad) Mole 14+16/1. Tillsammans med hadadaibis den fågel som alstrar mest decibel i Afrika!

34. Palm-nut Vulture *Gypohierax angolensis* (Palmgam)
Totalt 5 ex på 4 obsdagar.

35. Hooded Vulture *Necrosyrtes monachus* (Kappgam)

Allmän; observerad samtliga dagar.

36. White-backed Vulture *Gyps africanus* (Afrikansk vitryggad gam)
15, 15 resp. 2 ex Mole 14-16/1. Det för gamar fatala preparatet Diclofenac är numera portat i stora delar av Asien (där det fått flera gamarter att minska med upp till 99 %), men verkar istället dumpas i Afrika. Återstår att se hur situationen utvecklas där.

37. Rüppell's Vulture *Gyps rueppellii* (Rüppelgam)
2 ex Mole 14/1

38. White-headed Vulture *Trigonoceps occipitalis* (Vithövdad gam)
7 resp. 4 ex Mole 14-15/1

39. Brown Snake-Eagle *Circaetus cinereus* (Brun ormörn)
1 ex Mole 15/1.

40. Bateleur *Terathopius ecaudatus* (Gycklarörn)
1+5 ex SO Mole 13+16/1, >10 ex Mole 14-15/1.

41. Congo Serpent-Eagle *Dryotriorchis spectabilis* (Kongolesisk ormörn)
1 ex (ad) Antwikwaa 8/1, 1 ex Ankasa 10/1.

42. Western Marsh-Harrier *Circus aeruginosus* (Brun kärrhök)
2 ex Shai Hills 6/1, 1 ex Sakumo Lagoon 6/1, 2 ex Mole – Kintampo 16/1. Enbart honfärgade individer noterades.

43. African Harrier-Hawk *Polyboroides typus* (Afrikansk klätterhök)
Totalt 14 ex på 7 obsdagar.

44. Dark Chanting Goshawk *Melierax metabates* (Mörk sånghök)
1+2 ex SO Mole 13+16/1.

45. Gabar Goshawk *Micronisus gabar* (Gabarhök)
1 ex Takoradi 10/1.

46. Red-chested (African) Goshawk *Accipiter (tachiro) toussenelii* (Afrikansk duvhök)
1 ex Nsutu Forest 10/1.

47. Shikra *Accipiter badius* (Shikrahök)
Totalt 20 ex på 8 obsdagar.

48. Red-thighed Sparrowhawk *Accipiter erythropus* (Broksparvhök)
1 ex Antwikwaa 8/1, 1 ex (hanne) Ankasa 10/1.

49. Long-tailed Hawk *Urotriorchis macrourus* (Långstjärtad hök)
1 ex Kakum 7/1, 1 ex Antwikwaa 8/1.

- 50. Lizard Buzzard** *Kaupifalco monogrammicus* (Ödlevråk)
1 ex Shai Hills 6/1, 4 ex Shai Hills – Cape Coast 6/1,
2 ex Mole 15/1.
- 51. Grasshopper Buzzard** *Butastur rufipennis* (Gräshoppsvråk)
5 resp. 20 ex SO Mole 13+16/1, 8 resp. 5 ex Mole
14-15/1.
- 52. Red-necked Buzzard** *Buteo auguralis* (Röd-
nackad vråk)
Totalt 14 ex på 7 obsdagar.
- 53. Wahlberg's Eagle** *Aquila wahlbergi* (Wahlbergs
örn)
2 ex Mole 15/1.
- 54. Martial Eagle** *Polemaetus bellicosus* (Stridsörn)
1 ex (ad) Mole 14/1, 1 ex (yngre) Mole 15/1.
- 55. Common Kestrel** *Falco tinnunculus* (Tornfalk)
Totalt 9 ex på 5 obsdagar. Häckande *rufescens* är
betydligt mörkare än palearktiska flyttfåglar.
- 56. Grey Kestrel** *Falco ardosiaceus* (Grå tornfalk)
Totalt 13 ex på 8 obsdagar.
- 57. Eurasian Hobby** *Falco subbueto* (Lärkfalk)
1 ex Rainforest Lodge 7/1.
- 58. African Hobby** *Falco cuvieri* (Afrikansk lärkfalk)
1 ex Nsutu Forest 9/1.
- 59. Lanner Falcon** *Falco biarmicus* (Slagfalk)
2 ex Shai Hills 6/1, 2 ex Winneba Plain 6/1, 1 ex
Brenu Beach 11/1, 1 ex Mole 14-15/1, 1 ex Ko-
foridua 18/1.
- 60. Nkulengu Rail** *Himantornis haematopus* (Nku-
lengurall)
1 ex Nsutu Forest 9/1. (H)
- 61. White-spotted Flufftail** *Sarothrura pulchra*
(Vitfläckig pygméall)
3-5 ex dagligen 8-11/1 (Antwikwaa, Abrafo Forest,
Nsutu Forest, Ankasa). (H)
- 62. Black Crake** *Amaurornis flavirostra* (Korprall)
1 ex (hörd) Ankasa 10/1, 1 ex Koforidua – Accra
18/1.
- 63. Common Moorhen** *Gallinula chloropus*
(Rörhöna)
1 ex Nsutu Forest 9/1, 4 ex Koforidua – Accra 18/1.
- 64. Allen's Gallinule** *Porphyrio alleni* (Mindre
sultanhöna)
2 ex Koforidua – Accra 18/1.
- 65. African Purple Swamphen** *Porphyrio porphy-
rio madagascariensis* (Afrikansk purpurhöna)
2 ex Sakumo Lagoon 6/1.
- 66. African Finfoot** *Podica senegalensis* (Afrikansk
simrall)
2 ex (honfärgade) Ankasa 10/1.
- 67. African Jacana** *Actophilornis africanus* (Afri-
kansk jacana)
Totalt 30 ex på 9 obsdagar.
- 68. Greater Painted Snipe** *Rostratula benghalensis*
(Rallbeckasin)
1 ex (hanne) Mole 14/1.
- 69. Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus*
(Styllöpare)
15 ex Sakumo Lagoon 6/1.
- 70. Senegal Thick-knee** *Burhinus senegalensis*
(Senegaltjockfot)
10 ex Mole 13-16/1.
- 71. Water Thick-knee** *Burhinus vermiculatus* (Vat-
tentjockfot)
1 ex Twifo Praso 8/1.
- 72. Spotted Thick-knee** *Burhinus capensis*
(Fläcktjockfot)
2 ex Mole 15/1.
- 73. Collared Pratincole** *Glareola pratincola* (Röd-
vingad vadarsvala)
45 ex Sakumo Lagoon 6/1.
- 74. Rock Pratincole** *Glareola nuchalis liberiae*
(Klippvadarsvala)
5 ex Twifo Praso 8/1. Västafrikanska fåglar har
rostfärgad nacke och saknar komplett nackband.
- 75. Spur-winged Lapwing** *Vanellus spinosus*
(Sporrvipa)
10 ex Sakumo Lagoon 6/1, 1 ex Mole 13-16/1.
- 76. African Wattled Lapwing** *Vanellus senegallus*
(Vårtvipa)
4 ex O Sakumo Lagoon 6/1, 1 resp. 4 ex Mole 13-
14/1.
- 77. Senegal Lapwing** *Vanellus lugubris* (Sene-
galvipa)
30 ex Winneba Plain 6/1.
- 78. Grey Plover** *Pluvialis squatarola* (Kustpipare)
15 ex Sakumo Lagoon 6/1.
- 79. Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula*
(Större strandpipare)
50 ex Sakumo Lagoon 6/1.

- 80. Forbes's Plover** *Charadrius forbesi* (Savannstrandpipare)
1 ex Mole 15/1.
- 81. Whimbrel** *Numenius phaeopus* (Småspov)
2 ex Sakumo Lagoon 6/1, 1 ex Ankasa – Takoradi 11/1.
- 82. Spotted Redshank** *Tringa erythropus* (Svartsnäppa)
1 ex Sakumo Lagoon 6/1.
- 83. Common Redshank** *Tringa totanus* (Rödbena)
5 ex Sakumo Lagoon 6/1.
- 84. Common Greenshank** *Tringa nebularia* (Gluttsnäppa)
5 ex Sakumo Lagoon 6/1, 1 ex Amansure 11/1, 2 ex Brenu Beach 11/1.
- 85. Marsh Sandpiper** *Tringa stagnatilis* (Damm-
snäppa)
2 ex Sakumo Lagoon 6/1.
- 86. Green Sandpiper** *Tringa ochropus* (Skogssnäppa)
1 ex Brenu Beach 11/1, 2 ex Mole 14/1, 1 ex Mole – Kintampo 16/1.
- 87. Wood Sandpiper** *Tringa glareola* (Grönbena)
15 ex Sakumo Lagoon 6/1, 2 ex Mole 13/1.
- 88. Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* (Drillsnäppa)
Totalt 15 ex på 5 obsdagar.
- 89. Sanderling** *Calidris alba* (Sandlöpare)
3 ex Sakumo Lagoon 6/1.
- 90. Little Stint** *Calidris minuta* (Småsnäppa)
25 ex Sakumo Lagoon 6/1.
- 91. Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* (Spovsnäppa)
15 ex Sakumo Lagoon 6/1.
- 92. Pomarine Skua** *Stercorarius pomarinus* (Bredstjärtad labb)
1 ex Cape Coast Castle 9/1.
- 93. Royal Tern** *Thalasseus maxima* (Kungstärna)
5 ex Cape Coast Castle 9/1.
- 94. Sandwich Tern** *Thalasseus sandvicensis* (Kentsk tärna)
10 ex Sakumo Lagoon 6/1.
- 95. Common Tern** *Sterna hirundo* (Fisktärna)
2 ex Sakumo Lagoon 6/1.
- 96. (Feral) Rock Pigeon** *Columba livia domestica* (Tamduva)
Allmän i byar och städer; 10 obsdagar.
- 97. Speckled Pigeon** *Columba guinea* (Fläckig klippduva)
2+2 ex SO Mole 16/1.
- 98. Afep Pigeon** *Columba unicincta* (Afrikansk ringduva)
1 ex Bobiri Forest 17/1. (H)
- 99. Western Bronze-naped Pigeon** *Columba iriditorques* (Västlig bronsnackad duva)
3 ex Nsutu Forest 10/1, 1+3 ex (hörda) Ankasa 10-11/1, 1 ex (hörd) Aboabo Forest 12/1, 2 ex Bobiri Forest 17/1, 3 ex (hörda) Atewa Range 18/1.
- 100. Red-eyed Dove** *Streptopelia semitorquata* (Rödögd duva)
Mycket allmän; observerad alla dagar utom en.
- 101. Vinaceous Dove** *Streptopelia vinacea* (Vinduva)
Allmän utanför skogsbältet; 5 obsdagar.
- 102. Laughing Dove** *Streptopelia senegalensis* (Palmduva)
Allmän; observerad samtliga dagar.
- 103. Black-billed Wood-Dove** *Turtur abyssinicus* (Svarnäbbad fläckduva)
2 ex SO Mole 13/1, 15 ex Mole 14-16/1.
- 104. Blue-spotted Wood-Dove** *Turtur afer* (Blåfläckduva)
Totalt 35 ex på 7 obsdagar.
- 105. Tambourine Dove** *Turtur tympanistris* (Tambourinfläckduva)
Allmän (i skog); totalt 80 ex på 9 obsdagar.
- 106. Blue-headed Wood-Dove** *Turtur brehmeri* (Blåhuvad fläckduva)
7 ex Ankasa 11/1, 1 ex (hörd) Aboabo Forest 12/1.
- 107. Namaqua Dove** *Oena capensis* (Långstjärtsduva)
2+1 ex SO Mole 13+16/1.
- 108. African Green Pigeon** *Treron calvus* (Afrikansk grönduva)
Totalt 140 ex på 9 obsdagar.
- 109. Bruce's Green Pigeon** *Treron waalia* (Gulbukig grönduva)
8 ex Mole 13-16/1.

110. Grey Parrot *Psittacus erithacus* (Grå jacko)
2 ex Antwikwaa 8/1, 5 ex Aboabo Forest 12/1, 2 ex Bobiri Forest 17/1.

111. Red-fronted Parrot *Poicephalus gulielmi*
(Jardines papegoja)
Totalt 25 ex på 6 obsdagar.

112. Brown-necked Parrot *Poicephalus fuscicollis*
(Brunnackad papegoja)
5 ex Kakum 7/1, 3 ex Mole 15/1.

113. Senegal Parrot *Poicephalus senegalus*
(Senegalpapegoja)
10 ex Shai Hills 6/1, 10+25 ex Mole 14-15/1.

114. Red-headed Lovebird *Agapornis pullarius*
(Orangebröstad dvärgpapegoja)
8 ex Mole 15/1.

115. Rose-ringed Parakeet *Psittacula krameri*
(Halsbandsparakit)
1 ex Alexis Hotel 6/1, 5+3 ex Mole 14-15/1.

116. Great Blue Turaco *Corythaeola cristata*
(Jätteturako)
6 ex Abrafo Forest 8/1, 1 ex (hörd) Nsutu Forest 9/1,
1 ex (hörd) Ankasa 10/1.

117. Violet Turaco *Musophaga violacea* (Violett turako)
9 ex Shai Hills 6/1, 5 ex Mole 14-15/1.

118. Guinea [Green] Turaco *Tauraco persa*
(Guineaturako)
1 ex Shai Hills 6/1. (H)

119. Yellow-billed Turaco *Tauraco macrorhynchus*
(Tofsturako)
Totalt 25 ex på 7 obsdagar. Sedd fint Kakum 7/1,
därutöver endast hörd.

120. Western Grey Plantain-eater *Crinifer piscator*
(Grå larmfågel)
Totalt 60 ex på 6 obsdagar.

121. Levillant's [Striped] Cuckoo *Clamator levaillantii*
(Strimmig skatgök)
Totalt 6 ex på 4 obsdagar.

122. Thick-billed Cuckoo *Pachycoccyx audeberti*
(Tjocknäbbad gök)
1 ex Bobiri Forest 17/1.

123. Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius*
(Rödbröstad gök)
1 ex Atewa Range 18/1. (H)

124. Black Cuckoo *Cuculus clamosus gabonensis*
(Kaffergök)

1 ex Kakum 7/1, 5 ex Aboabo Forest 12/1. Västafrikanska fåglar skiljer sig markant från sina svarta artfränder i öst/syd.

125. Olive Long-tailed Cuckoo *Cercococcyx olivinus*
(Olivgrå långstjärtsgök)
2 ex Kakum 7/1, 2 ex Antwikwaa 8/1, 2 ex Ankasa 11/1. (H)

126. African Emerald Cuckoo *Chrysococcyx cupreus*
(Afrikansk smaragdgök)
Totalt 6 ex på 5 obsdagar. Två tredjedelar av individerna sågs faktiskt, mot normalt endast en bråkdel.

127. Yellow-thoated Cuckoo *Chrysococcyx flavigularis*
(Gulstrupig smaragdgök)
1 ex Aboabo Forest 12/1. (H)

128. Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas* (Klaasgök)
Totalt 11 ex på 5 obsdagar.

129. Diederik Cuckoo *Chrysococcyx caprius*
(Didrikgök)
2 ex Atewa Range 17-18/1.

130. Blue Malkoha [Yellowbill] *Ceuthmochares aereus*
(Blå malkoha)
Totalt 13 ex på 7 obsdagar.



Blue Malkoha.

Foto: Daniel Bengtsson

131. Black-throated Coucal *Centropus leucogaster*
(Svartstrupig sporrök)
Totalt 17 ex på 6 obsdagar. Endast ett par skimtar av denna skulkiga skogssporrök.

132. Blue-headed Coucal *Centropus monachus*
(Blåhuvad sporrök)
1 ex Aboabo Forest 12/1. (H)

133. Senegal Coucal *Centropus senegalensis*
(Senegalsporrök)
Totalt 25 ex på 10 obsdagar.

- 134. Barn Owl** *Tyto alba* (Tornuggla)
1 ex Rainforest Lodge 8+12/1.
- 135. African Scops-Owl** *Otus senegalensis* (Afrikansk dvärguv)
5 ex Mole 14-16/1. En individ sågs på bara ett par meters håll, övriga hörda.
- 136. Greyish Eagle-Owl** *Bubo cinerascens* (Grå fläckuv)
1 par Mole 13-16/1. Hördes frekvent och sågs vid ett par tillfällen vid hotellet.
- 137. Fraser's Eagle-Owl** *Bubo poensis* (Frasers uv)
1 ex Abrafo Forest 8/1.
- 138. Akun Eagle-Owl** *Bubo leucostictus* (Akunuv)
1 ex Nsutu Forest 9/1, 1 ex Ankasa 10/1. (H)
- 139. Pel's Fishing-Owl** *Scotopelia peli* (Afrikansk fiskuggla)
1 ex Mole 14/1. Fantastisk obs på en individ som betraktade oss med sina stora, svarta, djupa, mystiska ögon alldeles innan skymningen.
- 140. Pearl-spotted Owlet** *Glaucidium perlatum* (Pärilsparvuggla)
1 ex Mole 15/1.
- 141. African Wood-Owl** *Strix woodfordii* (Afrikansk skogsuggla)
2 ex Abrafo Forest 8/1, 3 ex Nsutu Forest 9/1, 2 ex Ankasa 10/1. (H)
- 142. Long-tailed Nightjar** *Caprimulgus climacurus* (Långstjärtad nattskärre)
1 ex Bonkro 12/1, 3+3 ex Mole 14-15/1.
- 143. Standard-winged Nightjar** *Macrodipteryx longipennis* (Vimpelnattskärre)
3+3 ex Mole 14-15/1.
- 144. Black Spinetail** *Telacanthura melanopygia* (Svart taggstjärtseglare)
3 ex Aboabo Forest 12/1.
- 145. Sabine's Spinetail** *Rhaphidura sabini* (Sabines taggstjärtseglare)
1 ex Kakum 7/1, 3 ex Nsutu Forest 10/1, 1 ex Ankasa 11/1, 5 ex Aboabo Forest 12/1.
- 146. Cassin's Spinetail** *Neafrapus cassini* (Cassins taggstjärtseglare)
1 ex Kakum 7/1, 5 ex Aboabo Forest 12/1.
- 147. African Palm-Swift** *Cypsiurus parvus* (Afrikansk palmseglare)
Allmän; 11 obsdagar.
- 148. Common Swift** *Apus apus* (Tornseglare)
Minst 4 obsdagar.
- 149. African Black Swift** *Apus barbatus* (Svartseglare)
25 ex Kakum 7/1. Denna art förekommer uppenbarligen i betydligt större utsträckning i Västafrika än tidigare känt.
- 150. Little Swift** *Apus affinis* (Stubbstjärtseglare)
Allmän; 10 obsdagar.
- 151. Narina Trogon** *Apaloderma narina* (Narina-trogon)
1 ex (hanne) Bobiri Forest 17/1, 2 ex (hörda) Atewa Range 18/1.
- 152. Malachite Kingfisher** *Alcedo cristata* (Malakitkungsfiskare)
3+1 ex Mole 14-15/1.
- 153. Shining-blue Kingfisher** *Alcedo quadribrachys* (Blåryggad kungsfiskare)
1 ex Ankasa 10/1.
- 154. White-bellied Kingfisher** *Alcedo leucogaster* (Vitbukad kungsfiskare)
2 ex Ankasa 10/1.
- 155. African Pygmy Kingfisher** *Ispidina picta* (Afrikansk pygmékungsfiskare)
3 ex Shai Hills 6/1, 2 ex Abrafo Forest 9/1, 1 ex Mole 15/1, 1+1 ex Atewa Range 17-18/1.
- 156. Chocolate-backed Kingfisher** *Halcyon badia* (Mindre smyrnakungsfiskare)
3 ex Atewa Range 18/1. Fina obsar på två individer av denna tämligen svårsedda skogskungsfiskare.
- 157. Grey-headed Kingfisher** *Halcyon leucocephala* (Gråhuvad kungsfiskare)
6-7 ex Mole 14-16/1, 1 ex Atewa Range 18/1.
- 158. Woodland Kingfisher** *Halcyon senegalensis* (Savannkungsfiskare)
Totalt 45 ex på 8 obsdagar.
- 159. Blue-breasted Kingfisher** *Halcyon malimbica* (Blåbröstad kungsfiskare)
1+1 ex Nsutu Forest 9-10/1, 1+1 ex Ankasa 10-11/1, 1 ex Mole 16/1. (H)
- 160. Striped Kingfisher** *Halcyon chelicuti* (Strimkungsfiskare)
2 ex (hörda) + 1 ex (sedd) Mole 14-15/1.
- 161. Giant Kingfisher** *Megaceryle maxima* (Jättekungsfiskare)
1+2+1 ex Mole 13-15/1.

162. Pied Kingfisher *Ceryle rudis* (Gråfiskare)
Totalt 18 ex på 5 obsdagar.

163. Black Bee-eater *Merops gularis gularis*
(Svart biätare)
2 ex Kakum 7/1, 2 ex Antwikwaa 8/1, 1 ex Abrafo Forest 9/1, 1 ex Nsutu Forest 10/1, 1+1 ex Ankasa 10-11/1. Nominatrasen skiljer dig från *australis* (som bl a förekommer i Uganda) genom ljusblått ögonbrynsstreck.

164. Blue-headed Bee-eater *Merops muelleri mentalis* (Blåhuvad biätare)
4 ex Atewa Range 18/1. Den centralafrikanska nominatrasen saknar stjärtspröt och har ljus panna.

165. Red-throated Bee-eater *Merops bullocki*
(Rödstrupig biätare)
1, 25, 20 resp. 5 ex Mole 13-16/1.



Red-throated Bee-eater. Foto: Daniel Bengtsson

166. Little Bee-eater *Merops pusillus*
(Dvärgbiätare)
2 ex Ntefrewa So 8/1, 1 ex Ankasa – Takoradi 11/1, 2 ex Atewa Range 17/1.

167. White-throated Bee-eater *Merops albicollis*
(Vitstrupig biätare)
Totalt 250 ex på 9 obsdagar.

168. Rosy Bee-eater *Merops malimbicus* (Rosenbiätare)
2 ex Kakum 7/1, 2 ex Antwikwaa 8/1, 7 resp. 35 ex Abrafo Forest 8-9/1, 2 ex Nsutu Forest 10/1, 10 ex Atewa Range 18/1. Den fina flocken vid Abrafo Forest var en av resans främsta ornitologiska höjdpunkter.

169. Northern Carmine Bee-eater *Merops nubicus* (Nordlig karminbiätare)
2 ex Mole 15/1.

170. Abyssinian Roller *Coracias abyssinicus*
(Savannblåkråka)
2+2 ex Mole 14-15/1, 2 ex SO Mole 16/1.

171. Rufous-crowned Roller *Coracias naevius*
(Fläckblåkråka)
3+3 ex SO Mole 13+16/1, 1+1 ex Mole 14-15/1, 1 ex Koforidua – Accra 18/1.

172. Blue-bellied Roller *Coracias cyanogaster*
(Gräddhuvad blåkråka)
9 ex Shai Hills 6/1, 3 ex Winneba Plain 6/1.

173. Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus*
(Gulnäbbad blåkråka)
Totalt 14 ex på 7 obsdagar.

174. Blue-throated Roller *Eurystomus gularis*
(Mindre blåkråka)
4+3 ex Abrafo Forest 8-9/1, 2 ex Nsutu Forest 10/1, 1 ex Bobiri Forest 17/1.

175. Green Wood-Hoopoe *Phoeniculus purpureus*
(Grön skratthärfågel)
6 ex Mole 14/1.

176. White-headed Wood-Hoopoe *Phoeniculus bollei*
(Vithövdad skratthärfågel)
4 ex Aboabo Forest 12/1.

177. Forest Wood-Hoopoe *Phoeniculus castaneiceps*
(Skogsskratthärfågel)
3 ex Ankasa 11/1, 1 ex Bobiri Forest 17/1.

178. African Grey Hornbill *Tockus nasutus*
(Afrikansk gråtoko)
Relativt allmän utanför skogsbältet; 5 obsdagar.

179. African Pied Hornbill *Tockus fasciatus*
(Skattoko)
Allmän; 10 obsdagar.

180. Northern Red-billed Hornbill *Tockus erythrorhynchus*
(Nordlig rödnäbbad toko)
2, 4 resp. 1 ex Mole 13-15/1.

181. Red-billed Dwarf Hornbill *Tockus camurus*
(Rödnäbbad dvärgtoko)
1 ex (hörd) Abrafo Forest 8-9/1, 2 ex Nsutu Forest 10/1, 2 ex Bobiri Forest 17/1.

182. Black Dwarf Hornbill *Tockus hartlaubi*
(Svart dvärgtoko)
3 ex Nsutu Forest 9/1.

183. White-crested Hornbill *Tropicranus albocristatus*
(Långstjärtad toko)
2 ex Kakum 7/1, 1 ex (hörd) Aboabo Forest 12/1, 2 ex Bobiri Forest 17/1.

184. Piping Hornbill *Bycanistes fistulator*
(Skrikhornkorp)
20 resp. 10 ex Nsutu Forest 9-10/1, 3 ex Ankasa 11/1, 2 ex Brenu Beach 11/1.

- 185. Brown-cheeked Hornbill** *Bycanistes cylindricus* (Brunhuvad hornkorp)
1 ex Kakum 7/1, 2 ex Nsutu Forest 9/1, 3 ex Aboabo Forest 12/1.
- 186. Black-casqued (Wattled) Hornbill** *Ceratomyxa atrata* (Svart hornkorp)
1 ex Abrafo Forest 8/1. (H)
- 187. Yellow-casqued (Wattled) Hornbill** *Ceratomyxa elata* (Gulkaskad hornkorp)
1 ex Kakum 7/1. (H)
- 188. Abyssinian Ground Hornbill** *Bucorvus abyssinicus* (Nordlig markhornkorp)
2+2 ex (2 par) Kakum 14-15/1.
- 189. Naked-faced Barbet** *Gymnobucco calvus* (Gambarbett)
Totalt 20 ex på 5 obsdagar. Förekommer ofta sida vid sida med borstbarbett.
- 190. Bristle-nosed Barbet** *Gymnobucco peli* (Borstbarbett)
5 ex Nsutu Forest 10/1, 15 ex Aboabo Forest 12/1, 10 ex Bobiri Forest 17/1. Förekommer ofta sida vid sida med gambarbett.
- 191. Speckled Tinkerbird** *Pogoniulus scolopaceus* (Fläckig dvärgbarbett)
Totalt 35 ex på 8 obsdagar.
- 192. Red-rumped Tinkerbird** *Pogoniulus atroflavus* (Rödguppad dvärgbarbett)
Totalt 25 ex på 8 obsdagar.
- 193. Yellow-throated Tinkerbird** *Pogoniulus subsulphureus* (Gulstrupig dvärgbarbett)
Totalt 25 ex på 8 obsdagar.
- 194. Yellow-rumped Tinkerbird** *Pogoniulus bilineatus* (Gulgumpad dvärgbarbett)
2 ex Abrafo Forest 9/1.
- 195. Yellow-fronted Tinkerbird** *Pogoniulus chrysoconus* (Gulpannad dvärgbarbett)
5 ex Shai Hills 6/1, 3-5 ex Mole 13-16/1.
- 196. Yellow-spotted Barbet** *Buccanodon duchaillui* (Gulfläckig barbett)
Totalt 35 ex på 8 obsdagar.
- 197. Hairy-breasted Barbet** *Tricholaema hirsuta* (Hårbröstad barbett)
Totalt 15 ex på 6 obsdagar.
- 198. Vieillot's Barbet** *Lybius vieilloti* (Vieillotbarbett)
4 ex Shai Hills 6/1, 1 ex Brenu Beach 11/1, 2 ex Atewa Range 17/1.
- 199. Bearded Barbet** *Lybius dubius* (Rödröstad barbett)
3 ex Mole 14-16/1.
- 200. Yellow-billed Barbet** *Trachyphonus purpuratus* (Gulnäbbad barbett)
1 ex (hörd) Antwikwaa 8/1, 1 ex (hörd) Nsutu Forest 10/1, 3 ex Aboabo Forest 12/1.
- 201. Cassin's Honeybird** *Prodotiscus insignis* (Cassins honungsgök)
1 ex Kakum 7/1, 1 ex Ankasa 10/1, 1 ex Aboabo Forest 12/1, 1 ex Bobiri Forest 17/1, 1 ex Atewa Range 18/1.
- 202. Yellow-footed Honeyguide** *Melignomon eisentrauti* (Gulfotad honungsgök)
1 ex Kakum 7/1, 1 ex (hörd) Bonkro Forest 12/1.
- 203. Least Honeyguide** *Indicator exilis* (Dvärghonungsgök)
1 ex (hörd) Bobiri Forest 17/1, 1 ex Atewa Range 17/1.
- 204. Lesser Honeyguide** *Indicator minor* (Mindre honungsgök)
1 ex Mole 15/1.
- 205. Greater Honeyguide** *Indicator indicator* (Svartstrupig honungsgök)
1 ex (hona) Mole 14/1.
- 206. African Piculet** *Sasia africana* (Afrikansk dvärgspett)
1 ex Aboabo Forest 12/1. (H)
- 207. Fine-spotted Woodpecker** *Campethera punctuligera* (Småprickig hackspett)
3 ex Mole 14/1.
- 208. Little Green Woodpecker** *Campethera maculosa* (Västafrikansk grönspett)
1 ex Antwikwaa 8/1.
- 209. Buff-spotted Woodpecker** *Campethera nivosa* (Termitspett)
1 ex (hörd) Kakum 7/1, 1 ex Antwikwaa 8/1, 1 ex Ankasa 11/1, 1 ex Bobiri Forest 17/1, 2 ex Atewa Range 17/1.
- 210. Cardinal Woodpecker** *Dendropicos fulvescens* (Kardinalspett)
2 ex Mole 14/1.
- 211. Melancholy Woodpecker** *Dendropicos lugubris* (Sorgspett)
1 ex Kakum 7/1, 1 ex Antwikwaa 8/1, 1 ex Nsutu Forest 10/1, 2 ex Atewa Range 17/1.

- 212. Grey Woodpecker** *Dendropicos goertae* (Afrikansk gråspett)
1, 3, 4 resp. 1 ex Mole 13-16/1.
- 213. Fire-bellied Woodpecker** *Dendropicos pyrrhogaster* (Eldbuksspett)
3 ex Kakum 7/1, 1 ex Antwikwaa 8/1, 1 ex Abrafo Forest 8/1, 1 ex (hörd) Ankasa 11/1, 3 ex Aboabo Forest 12/1.
- 214. Rufous-sided Broadbill** *Smithornis rufolateralis* (Rödsidig brednäbb)
1 ex Kakum 7/1, 1 ex Abrafo Forest 8/1, 1+1 ex Ankasa 10-11/1, 2 ex Bonkro Forest 12/1. En spelande hanne sågs bra i Kakum, övriga endast hörda.
- 215. African Shrike-Flycatcher** *Megabias flammulata* (Vitbröstad monarktörnskata)
1 ex (hona) Atewa Range 18/1.
- 216. Black-and-white [Vanga] Shrike-Flycatcher** *Bias musicus* (Tofsmonarktörnskata)
2 ex (1 par) Atewa Range 17-18/1.
- 217. Common [Brown-throated] Wattle-eye** *Platysteira cyanea* (Brunstrupig flikflugsnappare)
8 ex Shai Hills 6/1, 2 ex Brenu Beach 11/1, 1 ex Aboabo Forest 12/1, 2 ex Mole 15/1.
- 218. Chestnut Wattle-eye** *Dyaphorophya castanea* (Kastanjebrun flikflugsnappare)
4 ex Kakum 7/1, 1 ex (hona) Abrafo Forest 9/1, 2 ex Nsutu Forest 10/1, 3 ex Ankasa 11/1, 5 ex Atewa Range 18/1.
- 219. Red-cheeked Wattle-eye** *Dyaphorophya blissetti* (Brunkindad flikflugsnappare)
1 ex (hanne) Abrafo Forest 9/1.
- 220. West African Batis** *Batis occulta* (Västafrikansk batis)
1 ex (hona) Kakum 7/1.
- 221. Senegal Batis** *Batis senegalensis* (Senegalbatis)
1 ex (hörd) Shai Hills 6/1, 1+1 ex Mole 13+16/1.
- 222. White Helmet-Shrike** *Prionops plumatus* (Vit hjälmörnskata)
7 ex Shai Hills 6/1, 3 ex Mole 15/1.
- 223. Chestnut-bellied Helmet-Shrike** *Prionops caniceps* (Rödnäbbad hjälmörnskata)
7 ex Shai Hills 6/1, 3 ex Mole 15/1. Numera splittad från Rufous-bellied Helmet-Shrike *P. rufiventris*.
- 224. Brubru** *Nilaus afer* (Brubru)
1 ex (hörd) + 1 ex (hona) Mole 14-15/1.
- 225. Northern Puffback** *Dryoscopus gambensis* (Gambiadunrygg)
2 ex Shai Hills 6/1, 1+4+3 ex Mole 14-16/1.
- 226. Sabine's [Large-billed] Puffback** *Dryoscopus sabini* (Stornäbbad dunrygg)
5 ex Kakum 7/1, 1 ex (hanne) Nsutu Forest 10/1, 1 ex (hörd) Atewa Range 18/1.
- 227. Marsh Tchagra** *Bocagia minuta* (Sumptchagra)
1 ex (hanne) Atewa Range 17/1.
- 228. Black-crowned Tchagra** *Tchagra senegala* (Svartkronad tchagra)
6 ex Shai Hills 6/1, 2 ex Brenu Beach 11/1, 1 ex (hörd) Mole 15/1.
- 229. Sooty Boubou** *Laniarius leucorhynchus* (Sotbobo)
3 ex Abrafo Forest 9/1.
- 230. Yellow-crowned Gonolek** *Laniarius barbarus* (Flöjtgonolek)
5 ex Shai Hills 6/1, 5 ex Winneba Plain 6/1, 2 ex (hörda) Brenu Beach 11/1, 3+5 ex (mest hörda) Mole 14-15/1.
- 231. Sulphur-breasted Bush-Shrike** *Telophorus sulfureopectus* (Orangebröstad busktörnskata)
1 ex Mole 15/1.
- 232. Grey-headed Bush-Shrike** *Malaconotus blanchoti* (Gråhuvad busktörnskata)
2+1 ex Mole 14-15/1.
- 233. Common Fiscal** *Lanius collaris* (Fiskaltörnskata)
Totalt 35-40 ex på 8 obsdagar.
- 234. Yellow-billed Shrike** *Corvinella corvina* (Gulnäbbad törnskata)
7 ex Sakumo Lagoon 6/1, 2 ex Accra 18/1.
- 235. White-breasted Cuckoo-Shrike** *Coracina pectoralis* (Vitbröstad gråfågel)
2+1 ex Mole 14-15/1.
- 236. Blue Cuckoo-Shrike** *Coracina azurea* (Blå nålfågel)
1 ex (hanne) Aboabo Forest 12/1, 1 ex (hörd) Bobiri Forest 17/1.
- 237. Red-shouldered Cuckoo-Shrike** *Campophaga phoenicea* (Rödskuldrad nålfågel)
1 ex (hanne) Mole 15/1.
- 238. Western Black-headed Oriole** *Oriolus brachyrhynchus* (Västlig svarthuvudgylling)
1 ex Kakum 7/1, 5 ex Ankasa 11/1, 1 ex Aboabo Forest 12/1, 2 ex Bonkro Forest 12/1. Förekommer ofta sympatiskt med Black-winged Oriole.

239. Black-winged Oriole *Oriolus nigripennis*
(Svartvingad gylling)

Totalt 30-35 ex på 7 obsdagar. Förekommer ofta sympatiskt med Western Black-headed Oriole.

240. African Golden Oriole *Oriolus auratus*
(Afrikansk gylling)

15 ex Mole 14-16/1.

241. Square-tailed Drongo *Dicrurus ludwigii*
(Tvärstjärtad drongo)

3 ex Mole 15/1.

242. Shining Drongo *Dicrurus atripennis*
(Glansdrongo)

4 ex Ankasa 11/1, 3 ex Atewa Range 18/1.

243. Velvet-mantled Drongo *Dicrurus coracinus*
(Sammetsdrongo)

Totalt 25 ex på 8 obsdagar.

244. Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis*
(Klykstjärtad drongo)

2 ex Shai Hills 6/1, 5 ex Antwikwaa 8/1, 13 ex Mole 14-16/1.

245. Chestnut-capped Flycatcher *Erythrocerus mcallii*
(Röd kronad elminia)

4 ex Kakum 7/1, 2 ex Aboabo Forest 12/1, 5 ex Bobiri Forest 17/1, 2+2 ex Atewa Range 17-18/1.

246. African Blue Flycatcher *Elminia longicauda*
(Blå elminia)

2 ex Mole 15/1.

247. Blue-headed Crested Flycatcher
Trochocercus nitens (Blåhuvad monark)

2 ex Kakum 7/1, 1 ex Antwikwaa 8/1, 3 ex Aboabo Forest 12/1, 3 ex Bonkro Forest 12/1, 2 ex Bobiri Forest 17/1, 2 ex Atewa Range 18/1. Mest hörda individer, men sedd vid ett par tillfällen.

248. African Paradise-Flycatcher *Terpsiphone viridis*
(Afrikansk paradisflugsnappare)

1 ex Shai Hills 6/1, 1 ex Brenu Beach 11/1, 1 ex (hörd) + 1 ex (vit hanne) Mole 14-15/1.

249. Red-bellied Paradise-Flycatcher *Terpsiphone rufiventer*
(Röd paradisflugsnappare)

Totalt 30 ex på 8 obsdagar.

250. Piapiac *Ptilostomus afer* (Piapiak)

10 ex SO Mole 13/1.

251. Pied Crow *Corvus albus* (Svartvit kråka)

Allmän; observerad alla dagar utom 14-15/1 (Mole).



Pied Crow.

Foto: Daniel Bengtsson

252. Yellow-headed Picathartes *Picathartes gymnocephalus*
(Vithakad kråktrast)

4 ex Bonkro Forest 12/1. Som väntat blev detta den absoluta höjdpunkten på resan!



Yellow-headed Picathartes. Foto: Daniel Bengtsson

253. Western [Yellow-spotted] Nicator *Nicator chloris*
(Gulbrynad nikator)

Totalt 20 ex på 7 obsdagar.

254. Sun Lark *Galerida modesta* (Sollärka)

5 resp. 3 ex Mole 14-15/1.

255. Rock Martin *Ptyonoprogne fuligula* (Afrikansk klippsvala)

10 ex Shai Hills 6/1.

256. Barn Swallow *Hirundo rustica* (Ladusvala)

Allmän; observerad med säkerhet alla dagar utom två.

257. Red-chested Swallow *Hirundo lucida* (Guineasvala)

7 ex Mole 15/1, 5 ex Larabanga 16/1.

258. Ethiopian Swallow *Hirundo aethiopica*
(Etiopisk svala)

Minst 6 ex på 4 obsdagar.

259. Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii*
(Trådstjärtsvala)

3 ex Mole 14/1.

- 260. White-throated Blue Swallow** *Hirundo nigrita* (Safirsvåla)
5 ex Twifo Praso 8/1.
- 261. Lesser Striped Swallow** *Cecropis abyssinica* (Mindre strimsvåla)
5 ex nära Aboabo Forest 12/1, 10 ex Atewa Range 18/1, 2 ex Koforidua – Accra 18/1.
- 262. Preuss's (Cliff) Swallow** *Petrochelidon preussi* (Kamerunklippsvåla)
150 ex Winneba Plain 6/1, 20 ex Ntefrewa So 8/1, 2 ex nära Aboabo Forest 12/1. Stor ansamling i anslutning till gräsbrand på Winneba Plain.
- 263. Square-tailed Saw-wing** *Psalidoprocne nitens* (Tvärstjärtad kamvingesvåla)
2 ex Nsutu Forest 10/1, 5+2 ex Ankasa 10-11/1.
- 264. Fanti Saw-wing** *Psalidoprocne obscura* (Fantikamvingesvåla)
5 ex Kakum 7/1, 3 ex Antwikwaa 8/1, 10 ex Abrafo Forest 9/1.
- 265. Northern [Common] House-Martin** *Delichon urbicum* (Hussvåla)
3 ex Bobiri Forest – Atewa Range 17/1.
- 266. White-shouldered (Black) Tit** *Melaniparus guineensis* (Guineames)
2 ex Shai Hills 6/1, 5+5+2 ex Mole 14-16/1.
- 267. Forest Penduline-Tit** *Anthoscopus flavifrons* (Skogspungmes)
2 ex Kakum 7/1, 4 ex Aboabo Forest 12/1.
- 268. Tit-Hylia** *Pholidornis rufiae* (Meshylia)
2 ex Abrafo Forest 9/1, 2 ex Bobiri Forest 17/1, 1 ex Atewa Range 17/1.
- 269. Common Bulbul** *Pycnonotus barbatus* (Trädgårdsbulbyl)
Mycket allmän; observerad samtliga dagar.
- 270. Slender-billed Greenbul** *Andropadus gracilirostris* (Smalnäbbad grönbulle)
Totalt 25-30 ex på 7 obsdagar.
- 271. Little Grey Greenbul** *Andropadus gracilis* (Dvärgbulbyl)
1 ex Nsutu Forest 10/1, 1 ex (hörd) Aboabo Forest 12/1, 3 ex (hörda) Atewa Range 18/1.
- 272. Anson's Greenbul** *Andropadus ansoni* (Anson's grönbulle)
2 ex Kakum 7/1, 2 ex Bobiri Forest 17/1.
- 273. Plain [Cameroon Sombre] Greenbul** *Andropadus curvirostris* (Lövgrönbulle)
5 ex Kakum 7/1, 2 ex (hörda) Aboabo Forest 12/1.
- 274. Little Greenbul** *Andropadus virens* (Mindre grönbulle)
Totalt 45 ex på 8 obsdagar.
- 275. Yellow-whiskered Greenbul** *Andropadus latirostris* (Mustaschgrönbulle)
5 ex Kakum 7/1, 2 ex (hörda) Nsutu Forest 10/1, 4 ex Ankasa 11/1.
- 276. White-throated Greenbul** *Phyllastrephus albigularis* (Vitsstrupig grönbulle)
2 ex Kakum 7/1, 1 ex (hörd) Bobiri Forest 17/1, 1 ex (hörd) Atewa Range 18/1.
- 277. Icterine Greenbul** *Phyllastrephus icterinus* (Citrongrönbulle)
1 ex Kakum 7/1, 2 ex Antwikwaa 8/1, 15 ex Ankasa 11/1, 1 ex (hörd) Bobiri Forest 17/1.
- 278. Red-tailed Greenbul** *Criniger calurus* (Rödstjärtad grönbulle)
2 ex Abrafo Forest 9/1, 1 ex Nsutu Forest 10/1, 2 ex Ankasa 11/1, 1 ex Aboabo Forest 12/1, 5 ex Atewa Range 18/1.
- 279. Yellow-bearded Greenbul** *Criniger olivaceus* (Gulskäggig bulbyl)
4 ex Ankasa 11/1.
- 280. Western Bearded Greenbul** *Criniger barbatus* (Liberiabulbyl)
3 ex Kakum 7/1, 1 ex Nsutu Forest 9/1, 1 ex Ankasa 11/1, 1 ex Bonkro Forest 12/1. (H)
- 281. Golden Greenbul** *Calyptocichla serina* (Gyllengrönbulle)
4 ex Kakum 7/1.
- 282. Red-tailed [Common] Bristlebill** *Bleda syndactylus* (Rödstjärtad borstbulbyl)
3 ex Ankasa 11/1, 2 ex (hörda) Bonkro Forest 12/1, 3 ex Bobiri 17/1, 1 ex (hörd) Atewa Range 18/1.
- 283. Green-tailed Bristlebill** *Bleda eximius* (Grönstjärtad borstbulbyl)
1 ex (hörd) Kakum 7/1, 5 ex Atewa Range 18/1.
- 284. Grey-headed Bristlebill** *Bleda canicapillus* (Gråhuvad borstbulbyl)
2 ex Kakum 7/1, 1 ex Abrafo Forest 9/1, 4 ex Ankasa 11/1, 1 ex Bonkro Forest 12/1, 1 ex Atewa Range 18/1. Sedd Ankasa, annars endast hörd.
- 285. Simple Greenbul [Leaflove]** *Chlorocichla simplex* (Vitbrynad grönbulle)
Totalt 30 ex på 7 obsdagar.

286. Yellow-throated Greenbul [Leaflove] *Chlorocichla flavicollis* (Gulstrupig grönbulle)
2 ex Mole 15/1.

287. Swamp (Palm) Greenbul *Thescelocichla leucopleura* (Träskgrönbulle)
Totalt 30 ex på 5 obsdagar.

288. Honeyguide Greenbul *Baeopogon indicator* (Honungsgökbulbyl)
Totalt 25 ex på 7 obsdagar.

289. Spotted Greenbul *Ixonotus guttatus* (Fläckgrönbulle)
1 ex Ankasa 11/1. (H)

290. Green Crombec *Sylvietta virens* (Grön krombek)
Totalt 20 ex på 7 obsdagar.

291. Lemon-bellied Crombec *Sylvietta denti* (Citronkrombek)
Totalt 10 ex på 6 obsdagar.

292. Northern Crombec *Sylvietta brachyura* (Nordlig krombek)
3 ex Shai Hills 6/1, 3-4 ex Mole 13-16/1.

293. African Moustached Warbler *Melocichla mentalis* (Skäggsångare)
1+1 ex Mole 15/1.

294. Grey Longbill *Macrosphenus concolor* (Olivlångnäbb)
Totalt 20 ex på 6 obsdagar. En individ sedd i/under ögonhöjd Kakum, övriga endast hörda.

295. Kemp's Longbill *Macrosphenus kempii* (Rostflankad långnäbb)
1 ex Antwikwaa 8/1, 1 ex Nsutu Forest 10/1, 1 ex Aboabo Forest 12/1, 3 ex Atewa Range 18/1. En individ sedd sista dagen, övriga endast hörda. I princip identisk förekomst med grön camaroptera.

296. Willow Warbler *Phylloscopus trochilus* (Lövsångare)
2, 5, 4 resp. 2 ex Mole 13-16/1.

297. Wood Warbler *Phylloscopus sibilatrix* (Grönsångare)
5 ex Kakum 7/1, 4 ex Bobiri Forest 17/1, 4 ex Atewa Range 18/1.

298. Melodius Warbler *Hippolais polyglotta* (Polyglottsångare)
1 ex Mole 13/1. 1+1 ex Mole 14+16/1 var troligen också polyglotter, med liten reservation för härm-sångare (för korta observationer).

299. Black-capped Apalis *Apalis nigriceps* (Svartkronad apalis)

1 ex Nsutu Forest 10/1, 3 ex Atewa Range 18/1.

300. Sharpe's Apalis *Apalis sharpii* (Skiffera-palis)
Totalt 20-25 ex på 7 obsdagar.

301. Yellow-breasted Apalis *Apalis viridiceps* (Gulbröstad apalis)
2 ex Mole 15/1. (H)

302. Yellow-browed Camaroptera *Camaroptera superciliaris* (Gulbrynad camaroptera)
Totalt 30 ex (mest hörda) på 8 obsdagar.

303. Olive-green Camaroptera *Camaroptera chloronota* (Grön camaroptera)
1 ex Antwikwaa 8/1, 1 ex Nsutu Forest 10/1, 1 ex Aboabo Forest 12/1, 2 ex Atewa Range 18/1. En individ sedd sista dagen, övriga endast hörda. Om ytterligare en hade hörts den 18/1 hade förekomsten varit identisk med Kemp's Longbill.

304. Grey-backed Camaroptera *Camaroptera brevicaudata* (Gråryggad camaroptera)
Totalt 15-20 ex på 7 obsdagar.

305. Red-faced Cisticola *Cisticola erythrops* (Rödhättad grässångare)
Totalt 10 ex på 7 obsdagar. Normalt tämligen responsiv, men denna gång visade den sig inte förrän minuter innan sista ordinarie skådarsession avslutades.

306. Singing Cisticola *Cisticola cantans* (Vitbry-nad grässångare)
1 ex (hörd) Abrafo Forest 9/1, 2 ex Brenu Beach 11/1, 1+2 ex Mole 14-15/1.

307. Whistling Cisticola *Cisticola lateralis* (Vis-selgrässångare)
1 ex Abrafo Forest 9/1, 1 ex Atewa Range 17-18/1.

308. Croaking Cisticola *Cisticola natalensis* (Buskgrässångare)
7 ex Shai Hills 6/1, 3 ex Winneba Plain 6/1.

309. Short-winged [Siffling] Cisticola *Cisticola brachypterus* (Kortvingad grässångare)
2 ex Shai Hills 6/1, 8 ex Winneba Plain 6/1.

310. Rufous Cisticola *Cisticola rufus* (Rost-grässångare)
1+2 ex Mole 14-15/1.

311. Zitting Cisticola *Cisticola juncidis* (Grässångare)
1 ex Sakumo Lagoon 6/1. (H)

- 312. Oriole Warbler** *Hypergerus atriceps* (Gyllingsångare)
1 ex Winneba Plain 6/1, 1 ex Brenu Beach 11/1, 3+1 ex Mole 14-15/1. Kanonobs på ett par i Mole, annars endast hörd.
- 313. Tawny-flanked Prinia** *Prinia subflava* (Ockraflankad prinia)
Totalt 12 ex (mest hörda) på 6 obsdagar.
- 314. Red-winged Warbler [Prinia]** *Heliolais erythropterus* (Kastanjevingad prinia)
2 ex Winneba Plain 6/1, 2 ex Brenu Beach 11/1.
- 315. Senegal Eremomela** *Eremomela pusilla* (Senegaleremomela)
4 ex Shai Hills 6/1 samt 1, 10, 7 resp. 5 ex Mole 13-16/1.
- 316. Rufous-crowned Eremomela** *Eremomela badiceps* (Rödskronad eremomela)
10 ex Kakum 7/1, 7 ex Aboabo Forest 12/1, 5 ex Atewa Range 18/1.
- 317. Garden Warbler** *Sylvia borin* (Trädgårdsångare)
1 ex Shai Hills 6/1.
- 318. Green Hylia** *Hylia prasina* (Grön hylia)
Totalt 80 ex på 8 obsdagar. Talrik, men sällan sedd.
- 319. African Yellow White-eye** *Zosterops senegalensis* (Afrikansk gul glasögonfågel)
Totalt 20 ex på 8 obsdagar.
- 320. Black-capped Illadopsis** *Illadopsis cleaveri* (Grånackad illadopsis)
1 ex Kakum 7/1, 2 ex Ankasa 11/1, 2 ex Atewa Range 18/1. (H)
- 321. Puvel's Illadopsis** *Illadopsis puveli* (Brunbröstad illadopsis)
2 ex Abrafo Forest 9/1, 1 ex Atewa Range 18/1. Den första individen sågs med tålmod fint, övriga hörda.
- 322. Rufous-winged Illadopsis** *Illadopsis rufescens* (Gråflankad illadopsis)
2 ex Ankasa 11/1.
- 323. Brown Illadopsis** *Illadopsis fulvescens* (Brun illadopsis)
1 ex Antwikwaa 8/1, 2 ex Abrafo Forest 9/1, 1 ex Nsutu Forest 10/1, 3 ex Atewa Range 18/1. Sedd Abrafo Forest, annars endast hörd.
- 324. Blackcap Babbler** *Turdoides reinwardtii* (Svarthuvad skriktrast)
10 ex Mole 14-16/1.
- 325. Brown Babbler** *Turdoides plebejus* (Brun skriktrast)
1 ex (hörd) Shai Hills 6/1, 3 ex Alexis Hotel 6/1, 3 ex Mole 15/1.
- 326. Violet-backed Hyliota** *Hyliota violacea* (Violettryggad hyliota)
10 ex Kakum 7/1.
- 327. Pale Flycatcher** *Bradornis pallidus* (Blek flugsnappare)
1 ex Atewa Range 17/1.
- 328. Northern Black Flycatcher** *Melaenornis edolioides* (Svart flugsnappare)
2 ex Shai Hills 6/1, 4+3 ex Mole 14-15/1, 2 ex Atewa Range 18/1.
- 329. African [Fraser's] Forest-Flycatcher** *Fraseria ocreata* (Skogsflugsnappare)
1 ex Antwikwaa 8/1, 2 ex Aboabo Forest 12/1, 1 ex Atewa Range 18/1.
- 330. Pied Flycatcher** *Ficedula hypoleuca* (Svartvit flugsnappare)
1, 4, 6 resp. 2 ex Mole 13-16/1 samt 1 ex Atewa Range 18/1.
- 331. Spotted Flycatcher** *Muscicapa striata* (Grå flugsnappare)
2 ex Shai Hills 6/1, 1 ex Winneba Plain 11/1, 1 ex Atewa Range 17/1.
- 332. Swamp Flycatcher** *Muscicapa aquatica* (Sumpflugsnappare)
3 ex Mole 14/1.
- 333. Cassin's (Grey) Flycatcher** *Muscicapa cassini* (Flodflugsnappare)
2 ex Twifo Praso 8/1.
- 334. Little Grey Flycatcher** *Muscicapa epulata* (Pygméflugsnappare)
2 ex Kakum 7/1, 1 ex Aboabo Forest 12/1, 1 ex Atewa Range 18/1.
- 335. Ashy [Blue-grey] Flycatcher** *Muscicapa caeruleascens* (Askflugsnappare)
1 ex Atewa Range 18/1.
- 336. Dusky-blue Flycatcher** *Muscicapa comitata* (Ockragumpad flugsnappare)
1 ex Antwikwaa 8/1, 5 ex Aboabo Forest 12/1, 1 ex Atewa Range 17-18/1.
- 337. Ussher's Flycatcher** *Muscicapa ussheri* (Svartbrun flugsnappare)
4 ex Kakum 7/1, 5 resp. 3 ex Nsutu Forest 9-10/1, 2 ex Aboabo Forest 12/1, 1 ex Atewa Range 18/1.

- 338. Grey-throated Tit-Flycatcher** *Myioparus griseigularis* (Gråbröstad mesflugsnappare)
1 ex Antwikwaa 8/1, 1 ex Nsutu Forest 10/1, 1 ex Aboabo Forest 12/1. Sedd bra på sistnämnda lokal, övriga endast hörda.
- 339. Lead-coloured Flycatcher** *Myioparus plumbeus* (Grå mesflugsnappare)
2+2 ex Mole 14-15/1, 1 ex (hörd) Atewa Range 17/1.
- 340. Western Forest Robin** *Stiphrornis erythrothorax* (Västlig skogsskvätta)
1 ex Kakum 7/1, 2 ex (sedda) + 2 ex (hörda) Ankasa 10-11/1.
- 341. White-tailed Alethe** *Alethe diademata* (Vitstjärtad alethe)
2 ex Abrafo Forest 8/1, 4 ex Nsutu Forest 10/1, 2 ex Ankasa 11/1, 3 ex Atewa Range 18/1.
- 342. Blue-shouldered Robin-Chat** *Cossypha cyanocampter* (Blåvingesnärtrast)
2 ex Abrafo Forest 9/1. (H)
- 343. Snowy-crowned Robin-Chat** *Cossypha niveicapilla* (Rödnackad snärtrast)
1 ex Alexis Hotel 6/1, 1 ex Winneba Plain 6/1, 2 ex (ad+juv) Mole 15/1.
- 344. Finsch's Flycatcher-Thrush** *Stizorhina finschii* (Vitstjärtad flugtrast)
1 ex Antwikwaa 8/1.
- 345. White-tailed Ant-Thrush** *Neocossyphus poensis* (Vitstjärtad myrtrast)
1 ex Antwikwaa 8/1.
- 346. Whinchat** *Saxicola rubetra* (Buskaskvätta)
5 ex Shai Hills 6/1, 1 ex Mole 14/1.
- 347. Familiar Chat** *Cercomela familiaris* (Roststjärt)
1 ex Mole 16/1.
- 348. White-fronted Black-Chat** *Myrmecocichla albifrons* (Vitpannad termitkvätta)
3 ex Mole 15/1.
- 349. White-crowned (Mocking) Cliff-Chat** *Thamnolaea cinnamomeiventris coronata* (Vitronad klippskvätta)
1 ex (hanne) Shai Hills 6/1.
- 350. African Thrush** *Turdus pelios* (Aftontrast)
5 ex Shai Hills 6/1, 3 ex Mole 15-16/1, 3 ex Atewa Range 17/1.
- 351. Narrow-tailed Starling** *Poeoptera lugubris* (Smalstjärtad stare)
4 ex Nsutu Forest 9/1, 1 ex Atewa Range 17/1.
- 352. (Forest) Chestnut-winged Starling** *Onychognathus hartlaubii* (Rostvingad glansstare)
10 ex Kakum 7/1, 4 ex Abrafo Forest 8/1, 2 ex Nsutu Forest 9/1.
- 353. Bronze-tailed Glossy-Starling** *Lamprotonis chalcurus* (Bronsstjärtglansstare)
2 ex Mole 14/1.
- 354. Copper-tailed Glossy-Starling** *Lamprotonis cupreocauda* (Kopparstjärtglansstare)
2 ex Kakum 7/1, 3 ex Abrafo Forest 8/1, 1 ex Nsutu Forest 10/1, 5 ex Aboabo Forest 12/1, 2 ex Atewa Range 18/1.
- 355. Splendid Glossy-Starling** *Lamprotonis splendidus* (Praktglansstare)
Allmän; 10 obsdagar.
- 356. Purple Glossy-Starling** *Lamprotonis purpureus* (Purpurglansstare)
2 ex Shai Hills 6/1, 2 ex Mole 16/1.
- 357. Long-tailed Glossy-Starling** *Lamprotonis caudatus* (Långstjärtad glansstare)
5+1 ex Mole 14-15/1, 8 ex SO Mole 16/1.
- 358. Violet-backed Starling** *Cinnyricinclus leucogaster* (Ametiststare)
300 ex Kakum 7/1, 20 ex Abrafo Forest 9/1. Flera stora flockar passerade förbi tornet i Kakum på väg till övernattningsplats.
- 359. Yellow-billed Oxpecker** *Buphagus africanus* (Gulnäbbad oxhackare)
1 ex (på roanantilop) Mole 14/1.
- 360. Fraser's [Scarlet-tufted] Sunbird** *Deleornis fraseri* (Rödtofsad solfågel)
Totalt 30 ex på 7 obsdagar.
- 361. Mouse-brown [Mangrove] Sunbird** *Anthreptes gabonicus* (Brun solfågel)
2 ex Amansure 11/1.
- 362. Western Violet-backed Sunbird** *Anthreptes longuemarei* (Västlig violettryggad solfågel)
1 ex (hanne) Mole 14/1.
- 363. Little Green Sunbird** *Anthreptes seimundi* (Seimunds solfågel)
2 ex Kakum 7/1, 1 ex Antwikwaa 8/1, 1 ex Aboabo Forest 12/1.
- 364. Green Sunbird** *Anthreptes rectirostris* (Grön solfågel)
1 ex Antwikwaa 8/1.
- 365. Collared Sunbird** *Hedydipna collaris* (Halsbandssolfågel)
Totalt 100 ex på 8 obsdagar.

366. Pygmy Sunbird *Hedydipna platura* (Pygmésolfågel)
10 ex Mole 13-16/1.

367. Reichenbach's Sunbird *Anabathmis reichenbachii* (Reichenbachs solfågel)
2 ex Amansure 11/1.

368. Western Olive Sunbird *Cyanomitra obscura* (Västlig olivolfågel)
Totalt 50 ex på 8 obsdagar.

369. Green-headed Sunbird *Cyanomitra verticalis* (Grönhuvad solfågel)
2 ex Mole 15/1.

370. Blue-throated Brown Sunbird *Cyanomitra cyanolaema* (Blåstrupig solfågel)
1 ex (hörd) Kakum 7/1, 3 ex Antwikwaa 8/1, 5 ex Nsutu Forest 10/1, 5 ex Ankasa 11/1, 1 ex Bobiri Forest 17/1.

371. Scarlet-chested Sunbird *Chalcomitra senegalensis* (Rödbrostad solfågel)
2, 6, 10 resp. 5 ex Mole 13-16/1.

372. Buff-throated Sunbird *Chalcomitra adelberti* (Beigebröstad solfågel)
2 ex Kakum 7/1, 1 ex Antwikwaa 8/1, 2 ex Nkroful 11/1, 1 ex (hona) Atewa Range 18/1.

373. Variable Sunbird *Cinnyris venustus* (Charmolfågel)
1+1 ex Mole 14-15/1.

374. Olive-bellied Sunbird *Cinnyris chloropygius* (Olivbukad solfågel)
Totalt 25 ex på 6 obsdagar.

375. Tiny Sunbird *Cinnyris minullus* (Dvärgolfågel)
1 ex (hanne) Nsutu Forest 10/1, 1 ex (hanne) Bobiri Forest 17/1.

376. Copper Sunbird *Cinnyris cupreus* (Kopparsolfågel)
10 ex Brenu Beach 11/1.

377. Beautiful Sunbird *Cinnyris pulchellus* (Smyckesolfågel)
10, 10, 15 resp. 5 ex Mole 13-16/1.

378. Splendid Sunbird *Cinnyris coccinigaster* (Regnbågssolfågel)
5 ex Shai Hills 6/1, 3 ex Brenu Beach 11/1.

379. Johanna's Sunbird *Cinnyris johannae* (Johannasolfågel)
3 ex Kakum 7/1, 5 ex Nkroful 11/1, 1 ex (hanne) Bobiri Forest 17/1, 1 ex (hörd) Atewa Range 18/1.

380. Superb Sunbird *Cinnyris superbus* (Praktsolfågel)
Totalt 20 ex på 6 obsdagar.

381. Yellow Wagtail *Motacilla flava* (Gulärkla)
5 ex Sakumo Lagoon 6/1, 1 ex Kumasi 13/1.

382. African Pied Wagtail *Motacilla aguimp* (Brokärkla)
Totalt 35-40 ex på 11 obsdagar.



African Pied Wagtail. Foto: Daniel Bengtsson

383. Yellow-throated Longclaw *Macronyx croceus* (Gulstrupig sporrpiplärka)
2 ex Shai Hills 6/1, 1 ex Winneba Plain 6/1.

384. Plain-backed Pipit *Anthus leucophrys* (Gräspiplärka)
3 ex Winneba Plain 6/1.

385. Tree Pipit *Anthus trivialis* (Trädpiplärka)
2 ex Kumasi 13/1, 1 ex Mole 15/1.

386. Yellow-fronted Canary *Serinus mozambicus* (Mosambiksiska)
5, 5 resp. 1 ex Mole 14-16/1.

387. (Northern) Grey-headed Sparrow *Passer griseus* (Bysparv)
Allmän; 10 obsdagar.

388. Bush Petronia *Petronia dentata* (Buskstensparv)
Allmän Mole 13-16/1.



Bush Petronia, hona. Foto: Daniel Bengtsson

- 389. Chestnut-crowned Sparrow-Weaver** *Plocepasser superciliosus* (Brunkronad sparvvävare)
2 ex Mole 13-16/1.
- 390. Grosbeak Weaver** *Amblyospiza albifrons* (Tjocknäbbad vävare)
1 ex Abrafo Forest 9/1, 18 ex Bobiri Forest 17/1, 15 ex Atewa Range 17/1.
- 391. Little Weaver** *Ploceus luteolus* (Dvärg-maskvävare)
2+5+2 ex Mole 14-16/1.
- 392. Orange Weaver** *Ploceus aurantius* (Orange vävare)
5+1 ex Nkroful 10-11/1.
- 393. Black-necked Weaver** *Ploceus nigricollis* (Svartnackad vävare)
3 ex Antwikwaa 8/1, 2 ex Aboabo Forest 12/1.
- 394. Black-headed [Yellow-backed] Weaver** *Ploceus melanocephalus* (Svarthuvad vävare)
15 ex Mole 14/1.
- 395. Heuglin's Masked Weaver** *Ploceus heuglini* (Heuglins maskvävare)
1 ex Mole 15/1.
- 396. Village [Spotted-backed] Weaver** *Ploceus cucullatus* (Byvävare)
Allmän; 9 obsdagar.
- 397. Vieillot's Black Weaver** *Ploceus nigerimus castaneofuscus* (Vieillots svartvävare)
Lokalt talrik; 7 obsdagar. Hannarna hos den västafrikanska rasen är vackert kastanjebruna på rygg, övergump och buk (helsvart hos andra raser).
- 398. Maxwell's Black Weaver** *Ploceus albinucha* (Vitnackad svartvävare)
2 ex Ankasa 11/1, 5 ex Atewa Range 18/1.
- 399. Yellow-mantled Weaver** *Ploceus tricolor* (Gulnackad vävare)
5 ex Kakum 7/1, 2 ex Nsutu Forest 10/1, 1 ex Aboabo Forest 12/1, 2 ex Bobiri Forest 17/1, 2 ex Atewa Range 17/1.
- 400. Preuss's (Golden-backed) Weaver** *Ploceus preussi* (Preussvävare)
2 ex Kakum 7/1, 1 ex Antwikwaa 8/1, 1 ex Bobiri Forest 17/1.
- 401. Compact Weaver** *Pachyphantes superciliosus* (Kortnäbbad vävare)
5 ex Atewa Range 17/1.
- 402. Red-headed Malimbe** *Malimbus rubricollis* (Röd huvad malimbe)
3 ex Kakum 7/1, 1 ex Antwikwaa 8/1, 2 ex Nsutu Forest 10/1, 9 ex Bobiri Forest 17/1, 1 ex Atewa Range 17/1.
- 403. Red-vented Malimbe** *Malimbus scutatus* (Bandmalimbe)
3 ex Abrafo Forest 9/1, 1 ex Nsutu Forest 9/1, 5 ex Aboabo Forest 12/1.
- 404. Crested Malimbe** *Malimbus malimbicus* (Tofsmalimbe)
2 ex Abrafo Forest 9/1, 1+2 ex Nsutu Forest 9-10/1, 1 ex Ankasa 11/1, 5 ex Aboabo Forest 12/1.
- 405. Gray's [Blue-billed] Malimbe** *Malimbus nitens* (Rödbröstad malimbe)
2 ex Kakum 7/1, 1 ex Abrafo Forest 9/1, 2 ex Nsutu Forest 10/1, 3 ex Ankasa 11/1.
- 406. Red-headed Weaver** *Anaplectes rubriceps leuconotus* (Scharlakansvävare)
1 ex Mole 15/1.
- 407. Northern Red Bishop** *Euplectes franciscanus* (Svartpannad eldvävare)
5 ex Mole 15/1.
- 408. Yellow-mantled Widowbird** *Euplectes macrourus* (Gulryggad vidafink)
10 ex Brenu Beach 11/1.
- 409. Grey-headed Nigrita** *Nigrita canicapilla* (Gråhuvad negerfink)
Totalt 50 ex på 8 obsdagar.
- 410. White-breasted Nigrita** *Nigrita fusconota* (Vitbröstad negerfink)
4 ex Kakum 7/1, 1 ex Antwikwaa 8/1, 1 ex Nkroful 11/1, 1 ex (hörd) Aboabo Forest 12/1.
- 411. Chestnut-breasted Nigrita** *Nigrita bicolor* (Tvåfärgad negerfink)
2+1 ex Ankasa 10-11/1, 1 ex Atewa Range 17/1.
- 412. Black-bellied Seedcracker** *Pyrenestes ostrinus* (Purpurastrild)
2 ex Abrafo Forest 9/1.
- 413. Western Bluebill** *Spermophaga haematina* (Rödbröstad blånäbb)
1 ex Nsutu Forest 10/1, 1 ex Bobiri Forest 17/1, 1 ex Atewa Range 18/1.
- 414. Red-billed Firefinch** *Lagonosticta senegala* (Rödnäbbad amarant)
3+3 ex Mole 14-15/1.
- 415. Bar-breasted Firefinch** *Lagonosticta rufopicta* (Vitbandad amarant)
Totalt 30 ex på 6 obsdagar.

416. Red-cheeked Cordon-bleu *Uraeginthus bengalus* (Rödkindad fjärilsfink)
5, 5, 5 resp. 10 ex Mole 13-16/1.



Red-cheeked Cordon-bleu, hona.
Foto: Daniel Bengtsson

417. Lavender Waxbill *Estrilda caerulescens*
(Lavendelastrild)
1+1 ex Mole 14+16/1.

418. Orange-cheeked Waxbill *Estrilda melpoda*
(Orangekindad astrild)
10 ex Kakum 7/1, 50+10 ex Mole 14-15/1, 30 ex
Atewa Range 17/1.

419. Bronze Mannikin *Lonchura cucullata*
(Mindre skatfink)
Allmän; 11 obsdagar.



Bronze Mannikin. Foto: Daniel Bengtsson

420. Black-and-white Mannikin *Lonchura bicolor*
(Glansskatfink)
20 ex Antwikwaa 8/1, 5 ex Abrafo Forest 9/1, 20
ex Atewa Range 17/1.

421. Wilson's Indigobird *Vidua wilsoni* (Brun-
vingad indigofink)
4 ex Mole 14/1. Parasiterar på (lägger ägg i bon
av) Bar-breasted Firefinch.

422. Pin-tailed Whydah *Vidua macroura* (Do-
minikaneränka)
40 ex Mole 14/1.

423. Togo Paradise Whydah *Vidua togoensis*
(Togoparadisänka)
1 ex (hanne) Mole 14/1. Dessutom 3 ex
Togo/Exclamatory Paradise Whydah.

424. Exclamatory Paradise Whydah *Vidua
interjecta* (Långstjärtad paradisänka)
1 ex (hanne) Mole 14/1.

Artlista däggdjur

(H) = endast hörd; 2 st.

1. Olive Baboon *Papio anubis* (Anubisbabian)

10 ex Shai Hills 6/1, 10+10 ex Mole 14-15/1.

2. Callithrix Monkey *Chlorocebus sabaeus*

20 ex Shai Hills 6/1, 40-45 ex Mole 14-16/1.

3. Lowe's (Mona) Monkey *Cercopithecus (mona) lowei*

1 ex Kakum 7/1, 1 ex Ankasa 10/1. (H)

4. Lesser Spot-nosed Monkey *Cercopithecus petaurista*

3 ex Shai Hills 6/1, 5 ex Kakum 7/1.

5. Potto *Perodictus potto*

1 ex Kakum 7/1.

6. Demidoff's Galago *Galago demidoff*

2 ex (hörda) Kakum 7/1, 2 ex Abrafo Forest 8/1, 2 ex (hörda) Nsutu Forest 9/1.

7. Straw-coloured Fruit Bat *Eidolon helvum*

15 ex Kumasi 17/1, 1000 ex Atewa Range – Koforidua 17-18/1.

8. Hammer-headed Bat *Hypsignathus monstrosus*

15 ex Nsutu Forest 9/1, 5 ex Ankasa 10/1.

9. Emin's Pouched Rat *Cricetomys emini* (Afrikansk jättepåsårta)

1 ex Kakum 8/1.

10. Striped Ground Squirrel *Xerus erythropus*

1 ex Mole 15/1.

11. Kintampo Rope Squirrel *Funisciurus substriatus*

1 ex Mole 15/1.

12. Fire-footed Rope Squirrel *Funisciurus pyrropus*

1 ex Abrafo Forest 9/1, 2 ex Nsutu Forest 10/1, 2 ex Ankasa 10/1, 1 ex Atewa Range 18/1.

13. Green Bush Squirrel *Paraxerus poensis*

1 ex (hörd) Antwikwaa 8/1, 1 ex Ankasa 11/1, 5 ex Bobiri Forest 17/1.

14. Red-legged Sun Squirrel *Heliosciurus rufobrachium*

1 ex Kakum 7/1.

15. Gambian Sun Squirrel *Heliosciurus gambianus punctatus*

Totalt 4 ex på 4 obsdagar.

16. Forest Giant Squirrel *Protoxerus stangeri*

1 ex Nsutu Forest 10/1, 1 ex (hörd) Aboabo Forest 12/1.

17. Western Palm [Temminck's Giant] Squirrel *Epixerus ebii*

1 ex Bonkro Forest 12/1.

18. African Palm Civet *Nandinia binotata*

2 ex Ankasa 10/1.

19. African Civet *Civettictis civetta*

1 ex Mole 14/1.

20. Western Tree Hyrax *Dendrohyrax dorsalis*

Noterad med 3-5 ex 7-10/1. Dess skräniga rop utgjorde de mest framträdande nattljuden i Kakum, Abrafo Forest, Nsutu Forest och Ankasa. (H)

21. African Savanna Elephant *Loxodonta africana africana* (Stäppelefant)

3 resp. 9 ex Mole 14-15/1.

22. Warthog *Phacochoerus africanus* (Vårtsvin)

15, 10 resp. 10 ex Mole 14-16/1.

23. Bushbuck *Tragelaphus scriptus*

5, 20, 10 resp. 3 ex Mole 13-16/1.

24. Buffon's Kob *Kobus kob kob*

10, 15, 80 resp. 3 ex Mole 13-16/1.

25. Defassa Waterbuck *Kobus ellipsiprymnus defassa*

9 ex Mole 14/1. Tvärtemot cirkulerande rykten (som säger att köttet smakar illa) är denna art ett populärt bytesdjur för lejon.

26. Roan Antelope *Hippotragus equinus*

10+2 ex Mole 14-15/1.



Common Agama.

Foto: Daniel Bengtsson

Artlista reptiler

1. Nile Crocodile *Crocodylus niloticus* (Nilkrokodil)
5 ex Mole 14-15/1.

2. Dwarf [Short-snouted] Crocodile
Osteolaemus tetraspis (Dvärgkrokodil)
1 ex Ankasa 10/1.

[**Spitting Cobra** *Naja sp.* (spottkobra)
1 ex Bonkro Forest 12/1.]

3. Green Tree Snake *Philothamnus irregularis*
1 ex Bonkro Forest 12/1.

4. Common [Red-headed Rock] Agama *Agama agama* (Vanlig agam)
Tämligen allmän, ibland talrik.

5. House Gecko *Hemidactylus mabouia* (Husgecko)
Enstaka ex på husväggar.

Artlista fjärilar

1. African Monarch [Common Tiger] *Danaus chryssipus*
15 ex Ntefrewa So 8/1, 10 ex Mole 15/1.

2. Blue Diadem *Hypolimnas salmacis*
1 ex Atewa Range 18/1.

3. Common Grass Yellow *Eurema hecabe*
Noterad Ankasa 11/1.