

Raphionacme

čeleď: Asclepiadaceae

Raphionacme angolensis

synonyma: *R. kubangensis*, *R. pachyodon*, *Zaczatea angolensis*

oblasti: Angola, Tanzánie

Pochází z Angoly a Tanzánie. Tloušťka kaudexu dosahuje až 20cm a výška 60cm. Kvítky jsou fialovočervenozelené.

Raphionacme arabica

Raphionacme borenensis

Raphionacme brownii

synonyma: *R. baguirmiensis*, *R. sudanica*

Raphionacme burkei

oblasti: Angola, Zimbabwe

Pochází z Angoly a Zimbabwe. Tloušťka kaudexu dosahuje až 30cm a výška 2m. Kvete zelenavými kvítky.

Raphionacme caerulea

synonyma: *Pentagonanthus caeruleus*

Raphionacme chimanimaniana

Raphionacme dyeri

Raphionacme elsana

Raphionacme flanaganii

synonyma: *R. scandens*

oblasti: KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Východní Kapsko

Roste v JAR. Tloušťka kaudexu dosahuje až 12 (i 20)cm. Vyrůstají z něj liánovité ovíjivé mírně dřevnatějící výhony délky až 2m. Listy jsou úzce eliptické, tmavě zelené, zpravidla zvlněné, dlouhé 4

- 9cm, široké 2cm, spodní strana je světlejší a ochlupená. Kvete nazelenalými 5ticípými květy o průměru 1,8cm s nafialovělou skvrnou na bázi, vnější strana je ochlupená a koruna má laloky ve tvaru V.

Vyžaduje dobře propustný substrát, v době vegetace bohatou závlivu a mimo ni naprosté sucho při teplotách až 5 - 10°C.

Množí se semeny nebo stonkovými řízků.

Raphionacme galpinii

synonyma: R. elata, R. macrorrhiza

Raphionacme globosa

synonyma: R. virgultorum

oblasti: Angola, Demokratická Republika Kongo (Zair), Jihoafrická Republika (JAR), Svazijsko, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe

Pochází z Angoly, jižní Afriky, Svazijska, Tanzánie, Zairu, Zambie a Zimbabwe. Tloušťka kaudexu dosahuje 20cm a výšky 0,5m. Kvete hnědými kvítky.

Raphionacme grandiflora

synonyma: Pentagonanthus grandiflorus, Pentagonanthus grandiflorus subsp. glabrescens, R. grandiflora subsp. glabrescens

Raphionacme haeneliae

Raphionacme hirsuta

synonyma: Apoxyanthera pubescens, Brachystelma hirsutum, Mafekingia parquetiana, R. divaricata, R. divaricata var. glabra, R. hirsuta var. glabra, R. obovata, R. pubescens, R. purpurea

Raphionacme inconspicua

Raphionacme keayi

Raphionacme lanceolata

synonyma: R. lanceolata var. latifolia

Raphionacme linearis

synonyma: R. linearis var. glabra, R. linearis var. puberula

Raphionacme longifolia

synonyma: R. decolor

Raphionacme longituba

synonyma: R. ernestiana, R. ernstiana

oblasti: Tanzánie

Pochází z Tanzánie. Tloušťka kaudexu dosahuje 15cm a výška 20cm. Délka nesukulentních listů dosahuje 3 - 4cm. Kvete zelenořůžovými kvítky.

Raphionacme lucens

Raphionacme madiensis

synonyma: R. wilczekiana

oblasti: Keňa, Tanzánie, Uganda

Pochází z Ugandy, Keni a Tanzánie. Tloušťka kaudexu dosahuje 10cm a výška 20cm. Kvete zelenořůžovými kvítky.

Raphionacme michelii

synonyma: R. gossweileri

Raphionacme monteiroae

oblasti: Mosambik, Zimbabwe

Pochází z Mosambiku a Zimbabwe. Tloušťka kaudexu dosahuje 15cm a výška 50cm. Kvete zelenými kvítky.

Raphionacme moyalica

Raphionacme namibiana

Raphionacme palustris

Raphionacme procumbens

oblasti: J Afrika

Pochází z jižní Afriky. Dorůstá výšky 75cm. Kaudex může dosáhnout průměru až 30cm. Vytváří vzpřímené, v dospělosti poléhající výhony. Listy vyrůstají vstřícně, mají eliptický až kopinatý tvar. Délka se pohybuje v rozmezí 2,5 - 6cm, šířka 0,5 - 1,5cm. Barva kulovitých květů je zelenofialová.

Raphionacme pulchella

Raphionacme splendens

synonyma: R. excisa, R. jurensis

Raphionacme sylvicola

Raphionacme utilis

Raphionacme velutina

synonyma: Brachystelma viridiflorum, R. burkei, R. dinteri

Raphionacme vignei

Raphionacme villicorona

Raphionacme welwitschii

synonyma: Chlorocyathus welwitschii, R. denticulata, R. ver dickii, Zucchellia angolensis

Raphionacme zeyheri

<https://www.rostliny.net/>